Schneiter AGRO AG

Produkte & Beratung für die Landwirtschaft

2018

Industrie Birren 30
CH-5703 Seon AG

Tel. 062 893 28 83
Fax 062 893 28 84
info@schneiteragro.ch
www.schneiteragro.ch

Empfehlungen für den Pflanzenschutz

Kontakte

Schneiter AGRO AG

Godi Diemi

Verkauf / Beratung
ZH / TG / SH

8305 Dietlikon ZH
Tel. 044 833 21 59

gottfried.diemi@bluewin.ch
Mobil 079 211 77 02

Joachim Hänni

Verkauf / Beratung
BE / SO / JU Süd

2502 Biel BE
Tel. 032 322 82 94
Fax 032 322 82 94
haenni.strauss@bluewin.ch
Mobil 079 475 77 63

Stefan Schnell

Verkauf / Beratung
TG / SG / AI / AR / GR

9300 Wittenbach SG

Fax 071 455 13 72
stefan.schnell@bluewin.ch
Mobil 079 692 06 06

Peter Weber

Verkauf / Beratung
AG / Zentralschweiz

Tel. 062 769 77 35
Fax 062 893 28 84
peter@schneiteragro.ch
Mobil 079 948 32 60

Edith Lüscher

Büro Seon

Tel. 062 769 77 33
Fax 062 893 28 84
edith@schneiteragro.ch

Hansruedi Glanzmann

Lager Seon

Tel. 062 769 77 39
Fax 062 893 28 84
hansruedi@schneiteragro.ch

Tamara Friedrich

Büro Seon

Tel. 062 769 77 32
Fax 062 893 28 84
tamara@schneiteragro.ch

Inhaltsverzeichnis

Pflanzenschutzprodukte A-Z	**Seiten**	**1 – 11**
Dosiertabelle	Seite	11
Kulturempfehlungen		
Getreide	Seite	13
Rüben	Seite	14
Mais / Eiweisserbsen	Seite	15
Wirkungstabelle Herbizide	Seite	16–17
Soja / Sonnenblumen / Raps	Seite	18
Kartoffeln	Seite	19
Gemüsebau	Seiten	20–24
Weinbau	Seite	25
Kernobstbau	Seite	26
Kirschen	Seite	27
Erdbeeren / Himbeeren	Seite	28
Wiesen und Weiden	Seite	29
Garten und Hof	Seite	30

Öffnungszeiten in Seon:

Montag - Freitag 07.30 - 12.00 Uhr
13.15 - 17.00 Uhr

Damit Ihre Ware noch am gleichen Tag spediert wird:
Bestellungseingang bis spätestens 14.00 Uhr.

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Neue Produkte

Globaztar SC
(22,93% Azoxystrobin 250 g/l)
Fungizid gegen diverse Krankheiten im Obst-, Beeren-, Gemüse- und Feldbau sowie für Zierpflanzen.

Glyphosat 360 TF
(30,8 % 360 g/l [als 41,6% Glyphosate-isopropylammoniumsalz (486 g/l)])
Systemisches, nicht-selektives Total-Blattherbizid. Tallowaminfrei. Ersetzt Glyphosat 360 S.

Mancozeb-Cymox
(68% Mancozeb; 4,5% Cymoxanil)
Teilsystemisches kombiniertes Fungizid für den Gemüse- und Kartoffelbau. WG-Formulierung.

Naceto
(32,5% Flufenacet (400 g/l);
16,3% Diflufenican (200 g/l)
Kombiniertes Herbizid zur Bekämpfung diverser Gräser und Ungräser im Wintergetreide.

Prado™
(27,9% Pethoxamid 300 g/l;
17,5% Terbuthylazin 187,5 g/l)
Herbizid für den Vorauflauf und den frühen Nachauflauf gegen einjährige Unkräuter und Gräser in Maiskulturen. Ersatz für Successor T®.

Namensänderungen

Crop-Set = *neu* Impro-Set / Dicavel 480 = *neu* Manivel 480 / Vegoil = *neu* Vegoil+

Bewilligungserweiterungen

Oblix®200 EC *(Ethofumesate 200g/l)*:
NEU bewilligt in ***Spinat*** (Freiland): Aufwandmenge: 2 l/ha. Anwendung: 1 Behandlung. Vorauflauf. Stadium 00-09 (BBCH). Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use). Keine Anwendung im Herbst und im Winter.

Bewilligungsänderungen

MaisNico: Maximal 60g Wirkstoff/ha innerhalb von 2 Jahren auf der gleichen Parzelle ausbringen. Keine Anwendung in Schutzzonen S2 und Sh (Sh=Karstgebiete). *Gilt für alle Nicosulfuron-Produkte.*

Vegoil+: 1,2 - 2,5 l/ha, Erhöhung des Netz- und Haftvermögens. Ersetzt Vegoil.

Wichtige Hinweise

Wir weisen darauf hin, dass neben neu bewilligten und zurückgezogenen Indikationen auch bei bestehenden Pflanzenschutzmittelbewilligungen geänderte Anwendungsvorschriften zu beachten sind. Teilweise wurden die Aufwandmengen und die maximale Anzahl Anwendungen gesenkt sowie diverse Auflagen angepasst oder neu verfügt. Es ist daher unbedingt notwending, sich vor einer Anwendung auf die Packungsaufschrift sowie die unten aufgeführten Webseiten zu beziehen.

Angaben zu den Produkten können im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW
www.blw.admin.ch/psm
und / oder
auf der Webseite der Forschungsanstalt ACW
www.dataphyto.acw-online.ch
abgerufen werden.

Gewässerschutzauflagen der jeweiligen einzusetzenden Pflanzenschutzmittel sind unbedingt einzuhalten!

Weitere Infos unter:
www.schneiteragro.ch

Produkt		Art. Nr.	Verpackung	Richtpreis inkl. 2,5 % MWST	Preis je kg/l
Agro-Quick Biologisch abbaubares Reinigungsmittel für Spritzgeräte. **Anwendung: 2%**		6516	5 l 4 x 5 l	**74,90** **74,40**	14,98 14,88
Antischaum S Zur Schaumverhinderung für alle Spritzbrühen. **Anwendung: 14 ml in 1000 l Brühe**		6618	250 ml 10 x 250 ml	**21,10** **20,00** **inkl. 7,7% MWST**	84,40 80,00
Asulam S (Asulam 400 g/l) Selektives Herbizid gegen Blacken, Alpenblacken, Adler- und Wurmfarne. In Wiesen, Weiden, Stoppelfeldern und Obstanlagen. **Anwendung: 3 - 8 l/ha** Einzelstockbehandlung gegen Blacken: **Rückenspritze: 1% (1 dl in 10 l Wasser)** **Sobidoss / Rodoss: 10%**		6504 6505	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	**31,80** **30,10** **131,80** **131,30**	31,80 30,10 26,36 26,26
Bazooka (Imidacloprid 200 g/l) Insektizid für den Obst-, Feld- und Zierpflanzenbau. **Anwendung: 0,35 - 0,6 l/ha**		6663	1 l 12 x 1 l	**199,70** **198,60**	199,70 198,60
Bentazon 480 S (Bentazon 480 g/l) Herbizid für den Gemüse- und Feldbau. **Anwendung: 2 - 4 l/ha**		6565 6523	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	**56,90** **54,10** **246,70** **244,30**	56,90 54,10 49,34 48,86
Beta Star (Ethofumesat 100 g/l, Phenmedipham 80 g/l) Kombiniertes Herbizid für Zucker- + Futterrüben und Randen. **Anwendung: 2 - 3 x 1,5 - 2 l/ha, max. 6 l/ha**		6518	5 l 4 x 5 l	**97,80** **96,50**	19,56 19,30
Beta Super 3 (Metamitron 153 g/l, Ethofumesat 51 g/l, Phenmedipham 51 g/l) Kombiniertes Herbizid für Zucker- und Futterrüben. **Anwendung: Splitbehandlung: 2 - 3 x 3 l/ha, max. 9 l/ha**		6558	5 l 4 x 5 l	**159,70** **155,80**	31,94 31,16
BetaTeam (Ethofumesat 150 g/l, Phenmedipham 75 g/l, Desmedipham 25 g/l) Nachauflauf-Herbizid gegen einjährige Unkräuter in Zucker- und Futterrüben und Randen. Sehr verträgliche SE-Formulierung! **Anwendung: 1,25 - 1,5 l/ha pro Split, max. 4,25 l/ha**		6501	5 l 4 x 5 l	**178,00** **177,00**	35,60 35,40
Bittersalz microtop (15% MgO, 12% S, 1% B, 1% Mn, alles wasserlöslich) Sofort wirksamer Blattdünger für alle Kulturen im Freiland. **Anwendung: 2 - 5%**		6694	25 kg	**38,10**	1,52
Blackomat (MCPA 90 g, Dicamba 10 g, Rotfärbung) Rot eingefärbtes Herbizid für Einzelstockbehandlung gegen breitblättrige Unkräuter in Wiesen, Weiden und Rasen. Gräser werden geschont. Gebrauchsfertige Mischung. Kann je nach Sprühgerät bis 1:5 verdünnt werden.		6557 6556	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	**20,60** **19,50** **74,50** **74,00**	20,60 19,50 14,90 14,80
Blackomatgerät Solides Druckpumpgerät mit Verlängerung. Für mühelose Einzelstockbehandlung zum Beispiel mit Blackomat, Tribel plus oder anderen Produkten. Ideal auch für alle Sprüharbeiten im Haus, Feld und Stall.		6554	Stk. 10 x 1 Stk.	**44,50** **43,00** **inkl. 7,7% MWST**	44,50 43,00

Produkt		Art. Nr.	Verpackung	Richtpreis inkl. 2,5 % MWST	Preis je kg/l
Blackomat-Spritzrohr Ersatzverlängerung inkl. Düse		6810	Stk.	**25,00** **inkl. 7,7% MWST**	
Bonirat® Block (Difenacoum [CAS N° 56073–07–5] 0,005% [=0,05 g/kg]) Gebrauchsfertige Block-Köder Zur Ratten- und Mäusebekämpfung **Set: 1 kg Block-Köder inkl. 1 Raten Köder Station.** **Anwendung: gemäss Gebrauchsanleitung.**		6830 6831 6832 6575	1 kg 5 kg Set Rattenstation	**29,90** **126,50** **35,50** **10,80** **inkl. 7,7% MWST**	29,90 25,30
Bonirat® Pasta (Difenacoum [CAS N° 56073–07–5] 0,005% [=0,05 g/kg]) Gebrauchsfertige Pastenköder Zur Ratten- und Mäusebekämpfung **Set: 495 g Pastenköder inkl. 1 Maus Köderstation.** **Anwendung: gemäss Gebrauchsanleitung.**		6835 6833 6836 6534	495 g 3 kg Set Mausstation	**14,20** **84,50** **21,50** **4,95** **inkl. 7,7% MWST**	28,69 28,16
Bor 150 flüssig (Bor 150 g/l) Flüssiger Blattdünger zur Korrektur von Bormangel. **Anwendung: 1 - 5 l/ha**		6635	10 l	**68,90**	6,89
Bordeaubrühe WG (Kupfer als Kalkpräparat 20%) BIO Fungizid für den Obst-, Wein-, Feld-, Gemüsebau u. Beeren. **Anwendung: 2 - 18 kg/ha**		6564	20 kg	**192,80**	9,64
Buthyl (Bromoxynil (Phenol) 200 g/l, Terbuthylazin 300 g/l) Herbizid, breit wirkend gegen Unkräuter im Mais. **Anwendung: 1,5 - 2,0 l/ha**		6762	5 l 4 x 5 l	**219,00** **216,50**	43,80 43,30
Calciumchlorid 384 (Calcium-Cl 384 g/lt, inkl. Netzmittel) BIO Zur Bekämpfung der Stippe bei Äpfeln und gegen Calciummangel bei Gemüse. **Anwendung: 3 - 8 l/ha**		6524 6567	10 l Fass 200 l	**56,50** **890,00**	5,65 4,45
Captan 80 WG (Captan 80%) Fungizid für den Obstbau. **Anwendung: 0,15% / 2,4 kg/ha**		6617 6613	1 kg 10 x 1 kg 5 kg 4 x 5 kg	**29,00** **28,00** **112,50** **111,00**	29,00 28,00 22,50 22,20
CCC (Chlormequat 357 g/l) Phytohormonpräparat zur Verbesserung der Standfestigkeit des Getreides und zur Hemmung des Längenwachstums an Zierpflanzen. **Anwendung Korn: 0,5 - 2,5 l/ha.** **Zierpflanzen: Giessen: 0,1-0,5% Spritzen: 0,15-0,2%**		6566 6691	1 l 10 x 1 l 5 l 4 x 5 l	**15,00** **14,20** **45,00** **44,50**	15,00 14,20 9,00 8,90
Chanon (Aclonifen 600 g/l) Herbizid für den Feld- und Gemüsebau. Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser. **Anwendung: 1 - 3 l/ha**		6842	5 l 4 x 5 l	**184,90** **184,00**	36,98 36,80
Chloridazon 65 WG (Chloridazon 65%) Herbizid für Randen, Futter- und Zuckerrüben. **Anwendung: 2 - 4 kg/ha**		6525	1 kg 10 x 1 kg	**52,50** **49,90**	52,50 49,90

Produkt		Art. Nr.	Verpackung	Richtpreis inkl. 2,5 % MWST	Preis je kg/l
Chlorotal 500 (Chlorothalonil 500 g/l) Kontaktfungizid mit langer Wirkungsdauer für den Wein-, Gemüse-, Feld- und Zierpflanzenbau. **Anwendung: 0,2 - 0,3% / 1,5 - 3 l/ha** **Speisepilze: 4,5 ml/m²** (giessen)		6517 6580	5 l 4 x 5 l 10 l	**64,10** **62,90** **118,50**	12,82 12,58 11,85
Clio 100 (Clopyralid 103,1 g/l) Herbizid gegen Disteln in Futter- und Zuckerrüben, ökologischen Ausgleichsflächen und Nichtkulturland. **Anwendung: 1 - 1,2 l/ha**		6594	1 l 12 x 1 l	**89,60** **88,60**	89,60 88,60
Contender 80 WG (Aluminiumfosetyl-Al, 80%) Systemisches Fungizid für Erdbeeren, Birnen, den Gemüsebau, Hopfen und Zierpflanzenbau. **Anwendung: 0,25 - 0,5%**		6547	1 kg 10 x 1 kg	**29,00** **28,00**	29,00 28,00
Cupro-Folpet flüssig (Folpet 280 g/l, Kupfer 147 g/l) Kombiniertes Fungizid für den Wein- und Gemüsebau. **Anwendung: 0,2 - 0,3%**		6638	5 l 4 x 5 l	**115,00** **113,50**	23,00 22,70
Cuprum Flow (Kupfer [als Hydroxid] 24,4%) BIO Flüssiges Kontaktfungizid gegen Pilz- und Bakterienkrankheiten für Kartoffeln, im Beeren-, Obst-, Wein- und Gemüsebau. **Anwendung: 1,2 - 12 l/ha, je nach Kultur**		6800	5 l 4 x 5 l	**97,10** **96,60**	19,42 19,32
Curenox 50 WG (Kupfer [als Oxychlorid] 50%) BIO Fungizid gegen Pilzkrankheiten für den Beeren-, Obst-, Wein-, Gemüse-, Feld- und Zierpflanzenbau. Gemäss FiBL-Betriebsmittelliste für den biologischen Landbau empfohlen und zugelassen. **Anwendung: 0,1 - 1,0%, Kartoffeln: 7 kg/ha.**		6640 6637 6733 6731	1 kg 10 x 1 kg 4 kg 10 kg 20 kg	**27,10** **25,70** **75,30** **180,50** **352,70**	27,10 25,70 18,83 18,05 17,64
Curon 250 SC (Pencycuron 250 g/l) Flüssiges Saatbeizmittel für Kartoffeln gegen die Rhizoctonia-solani-Krankheit. **Anwendung: 0,6 ml/kg Saatgut**		6616	5 l 4 x 5 l	**230,50** **228,30**	46,10 45,66
Cymoxanil WG (Cymoxanil 45%) Systemisches Fungizid für den Gemüsebau und für Kartoffeln. **Anwendung: 0,16 - 0,27 kg/ha**		6629	1 kg 10 x 1 kg	**73,30** **69,60**	73,30 69,60
Cypermethrin S (Cypermethrin 100 g/l) Insektizid für den Beeren-, Gemüse-, Feld- und Zierpflanzenbau. **Anwendung: 0,25 l/ha**		6581 6551	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	**31,00** **30,00** **100,00** **98,50**	31,00 30,00 20,00 19,70
Dazide Enhance (Daminozide 85%) Wachstumsregulator zur Hemmung des Längenwachstums (Stauchen) an Zierpflanzen. **Anwendung: 0,06 - 0,6%**		6527	1 kg 6 x 1 kg	**335,00** **334,00**	335,00 334,00
Deltaphar® 25 EC (Deltamethrin 25 g/l) Insektizid für den Beeren-, Gemüse-, Feld- und Zierpflanzenbau. **Anwendung: 0,3 - 0,5 l/ha.** **Hopfen/Zierpflanzen: Anwendung: 0,03 - 0,05%**		6623	1 l 12 x 1 l	**89,30** **87,90**	89,30 87,90

Unverbindliche Richtpreise. Gültig ab 01.01.18, Preisänderungen vorbehalten.

Produkt		Art. Nr.	Verpackung	Richtpreis inkl. 2,5 % MWST	Preis je kg/l
Difcor 250 EC (Difenoconazole 250 g/l) Systemisches Fungizid für den Kern- und Steinobst, den Beeren-, Wein-, Gemüse- und Feldbau. **Anwendung: 0,2 - 0,5 l/ha**		6686 6699 6621	250 ml 20 x 250 ml 1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	**35,70** **33,90** **119,80** **117,50** **399,00** **397,00**	142,80 135,60 119,80 117,50 79,80 79,40
Diflanil 500 SC (Diflufenican 500 g/l) Getreide-Herbizid gegen Unkräuter. **Anwendung: 0,25 - 0,375 l/ha**		6614	1 l 12 x 1 l	**152,00** **150,00**	152,00 150,00
Diquat (Diquat dibromid 400 g/l) Herbizid zum Abbrennen von Unkräutern und Kartoffelstauden. **Anwendung: 0,4% / 2,5 - 5 l/ha**		6561 6562	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	**33,00** **31,50** **110,70** **110,20**	33,00 31,50 22,14 22,04
Dithianon 70 WG (Dithianon 70%) Kontaktfungizid für den Obst-, Wein- und Zierpflanzenbau. **Anwendung: 0,05 - 0,075%**		6821	1 kg 10 x 1 kg	**62,50** **59,30**	62,50 59,30
Diuron 80 (Diuron 80%) Bodenherbizid gegen Unkräuter und Ungräser für den Obst- und Weinbau. **Anwendung: 2,5 kg/ha**		6574	1 kg 10 x 1 kg	**56,00** **54,50**	56,00 54,50
Duroschneck Longlife (Metaldehyd 5%) Sehr dauerhaftes und regenbeständiges Qualitäts-schneckenkorn mit kleiner, gleichmässiger Granulierung. **Anwendung: 7 kg/ha**		6568 6553 6569	4 kg 3 x 4 kg 10 kg 25 kg	**39,50** **38,20** **71,50** **150,00**	9,87 9,55 7,15 6,00
Ethefon S (Ethefon 480 g/l) Wachstumsregulator zur Erhöhung der Standfestigkeit bei Winterroggen, Wintergerste und Triticale, sowie Blüten- und Fruchtausdünngung bei Äpfeln. **Anwendung: 0,3 - 1 l/ha**		6541 6542	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	**25,50** **23,90** **110,10** **109,60**	25,50 23,90 22,02 21,92
Ferro Rapid (Fe 6% [EDDHA Chelat]) Microgranulat gegen Eisenchlorose im Obst-, Wein-, Gemüse-, Beeren- und Zierpflanzenbau. **Anwendung: 0,2%**		6631	1 kg 10 x 1 kg	**33,00** **32,00**	33,00 32,00
Finy® (Metsulfuron-methyl 20%) Nachauflauf-Herbizid gegen Unkräuter im Getreide. **Anwendung: 25 - 40 g/ha**		6560	60 g 10 x 60 g	**71,50** **67,90**	
Flüssigdünger Ca (N 10%, CaO 15%, MgO 2% + B, Cu, Mo, Zn, Co, Fe) Calciumreicher Blattdünger für den Obst- und Gemüsebau. **Anwendung: 4 - 6 l/ha**		6619	10 l	**98,00**	9,80
Flüssigdünger S (N 9%, P2O5 3,6%, K2O 6,3% + Mg, Fe, B, Cu, Mn, Mo, Zn) Flüssiger Blatt- und Wurzeldünger für alle Kulturen. **Anwendung: 2 - 5 l/ha**		6550 6573	20 l Fass 200 l	**85,00** **700,00**	4,25 3,50
Flüssigdünger XL (N 10%, P2O5 10%, K2O 7,5% + Fe, B, Cu, Mn, Mo, Zn) Flüssiger Blatt- und Wurzeldünger für alle Kulturen. **Anwendung: 2 - 5 l/ha**		6597 6598	10 l Fass 200 l	**50,00** **790,00**	5,00 3,95

Unverbindliche Richtpreise. Gültig ab 01.01.18, Preisänderungen vorbehalten.

Produkt		Art. Nr.	Verpackung	Richtpreis inkl. 2,5 % MWST	Preis je kg/l
Folanx®Ca29 (Ca 29% [CaO 40,6%]) Calcium-Dünger für den Obst- und Weinbau. **Anwendung: 5 kg/ha**		6605	(3 x) 5 kg	**59,90**	11,98
Folio Micro (Mg 3,9%, Mn 2,9%, Fe 2,9%, Cu 1,05%, Zn 1,05%, B 0,4%, Mo 0,08%) Spurenelement-Mix für alle Freiland-Kulturen. **Anwendung: 1 - 2 kg/ha**	**500 g: So lange Vorrat!**	6512 6653	500 g 10 x 500 g 1 kg 10 x 1 kg	**19,50** **18,20** **37,40** **35,00**	39,00 36,40 37,40 35,00
Folpet 80 WDG (Folpet 80%) Fungizid für Hopfen, Obst- und Weinbau. **Anwendung: 0,125 - 0,15% (1,2 - 2,4 kg/ha).** **Hopfen: 0,25%**		6681 6578	1 kg 10 x 1 kg 5 kg 4 x 5 kg	**31,50** **30,00** **107,50** **107,00**	31,50 30,00 21,50 21,40
Gibberellin A3 (Gibberellin 9%) Wachstumsregulator zur Verbesserung des Fruchtansatzes bei Williams-Birnen und zur Förderung des Längenwachstums bei Zierpflanzen. **Anwendung: 1-2 Tabletten**		6650	10 Tabl.	**189,00**	
Globaztar SC (Azoxystrobin 250 g/l) Teilsystemisches Fungizid gegen Krankheiten im Feld-, Obst-, Gemüse- und Beerenbau sowie Zierpflanzen. **Anwendungen: 0,75 - 1 l/ha**	**Neu**	6662	5 l 4 x 5 l	**285,00** **283,20**	57,00 56,64
Globus (Florasulam 50 g/l) Systemisches Herbizid gegen ein- und mehrjährige Unkräuter im Getreide, Mais, Nichtkulturland und in offenen Ackerflächen gemäss DZV. **Anwendungen: 0,075 - 0,15 l/ha im Getreide** **0,1 l/ha im Mais** **0,03% gegen Ambrosia (mind. 0,15 l/ha)**		6754	500 ml 24 x 500 ml	**203,00** **201,00**	406,00 402,00
Glyphosat 360 TF (Glyphosat 360 g/l, Tallowaminfrei) Systemisches, nicht-selektives Total-Blattherbizid. **Anwendung: 2 - 10 l/ha (je nach Unkrautflora)** **Ersetzt Glyphosat 360 S**	**Neu** **Tallowaminfrei**	6536 6531 6585 6514	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l 10 l 20 l	**18,50** **18,00** **48,30** **47,80** **77,00** **148,80**	18,50 18,00 9,66 9,56 7,70 7,44
Hagar WG (Fenoxycarb 25%) Insektizid für den Zierpflanzenbau. **Anwendung: 0,025 - 0,05%**	**So lange Vorrat!**	6651	60 g 5 x 60 g 10 x 5 x 60 g	**22,00** **21,00** **19,50**	366,66 350,00 325,00
Himalaya® 60 SG (Maleinsäurehydrazid 60%) Wachstumsregulator für Kartoffeln und Zwiebeln zur Unterdrückung der Keimung während der Lagerung. **Anwendung: 3,75 - 5 kg/ha**		6825	5 kg 4 x 5 kg	**187,00** **185,00**	37,40 37,00
Ibiza SC (Fluazinam 500 g/l) Breit wirkendes Fungizid für den Weinbau, für Zwiebeln, Kartoffeln und Zierpflanzen. Regenbeständige Schutzwirkung. **Anwendung: 0,4 - 1,2 l/ha,** **Zierpflanzen: 0,04%**		6530	5 l 4 x 5 l	**348,00** **347,00**	69,60 69,40

Unverbindliche Richtpreise. Gültig ab 01.01.18, Preisänderungen vorbehalten.

Produkt			Verpackung	Richtpreis inkl. 2,5 % MWST	Preis je kg/l
Impro-Set (Crop-Set) (Div. Pflanzenextrakte, Fermentationsprodukte, Vitamine, org. gebundene Spurenelemente) BIO Pflanzenstimulator auf natürlicher Basis. Ertragssteigerung und gleichmässigere Knollen im Kartoffelbau. Höhere Erträge bei Raps, Getreide-, Gemüse- und Beerenbau. **Anwendung: 0,6 - 1 l/ha**		6712	1 l 10 x 1 l	**108,00** **106,00**	108,00 106,00
Iprodion 500 (Iprodion 500,6 g/l) Kontaktfungizid für den Gemüsebau. **Anwendung: 0,1 - 0,15%**	**so lange Vorrat!**	6608	1 l 12 x 1 l	**56,80** **54,50**	56,80 54,50
Kupfersulfat (Kupfersulfat > 80% [entspricht 25% Kupfer]) **Anwendung: 4 - 10%**		6559 6510	5 kg 3 x 5 kg 25 kg	**45,00** **44,50** **180,10**	9,00 8 90 7,20
Lenacil (Lenacil 80%) Herbizid für den Gemüsebau, Erdbeeren und Zuckerrüben. **Anwendung: Vorauflauf: 1,5 - 2 kg/ha** **Nachauflauf: 0,2 - 0,4 kg/ha Splitbehandlung: 0,1- 0,2 kg/ha**		6643	1 kg 10 x 1 kg	**114,20** **111,80**	114,20 111,80
MaisNico (Nicosulfuron 40 g/l) Nachauflauf-Herbizid gegen Unkräuter und Ungräser im Mais. **Anwendung: 0,5 - 1,5 l/ha**		6612 6678	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	**70,70** **67,10** **225,00** **223,00**	70,70 67,10 45,00 44.60
Mancozeb 75 WG (Mancozeb 75%) Fungizid für den Obst-, Wein-, Gemüse-, Feld- und Zierpflanzenbau. **Anwendung: 0,15 - 0,4%**		6563 6646	1 kg 10 x 1 kg 10 kg	**22,40** **21,30** **160,00**	22,40 21,30 16,00
Mancozeb-Cymox (Mancozeb 68%, Cymoxanil 4,5%) Teilsystemisches kombiniertes Fungizid für den Gemüse- und Kartoffelbau. WG-Formulierung. **Anwendung: 1,6 kg - 3 kg/ha**	**Neu** WG - Formulierung	6642 6639	3 kg 6 x 3 kg 10 kg	**43,20** **41,00** **135,00**	14,40 13,66 13,50
Mandolin (Clodinafop-propargyl 22,22%, Cloquintocet-mexyl 5,55%) Systemisches Herbizid gegen einjährige Ungräser im Getreidebau. **Anwendung: 0,2 - 0,35 l/ha**		6766	1 l 10 x 1 l	**195,00** **193,00**	195,00 193,00
Manivel 480 (Dicamba 40%) Herbizid gegen Unkräuter in Getreide und Mais. **Anwendung: 0,25 - 0,75 l/ha**		6716	1 l 10 x 1 l	**66,10** **62,80**	66,10 62,80
Mausköder S (Wirkstoff: Bromadiolone) Getreideköder zur Bekämpfung von Mäusen und Ratten.	**Flocken: so lange Vorrat!**	6636 6606 6611	Flocken 3 kg Körner 3 kg Körner 10 kg	**49,50** **49,50** **134,50** **inkl. 7,7% MWST**	16,50 16,50 13,45
MCPB 400 (MCPB 400 g/l) Herbizid gegen Hahnenfuss, Winden, Disteln u. a. Unkräuter im Beeren- und Feldbau und in Wiesen und Weiden. **Anwendung: 0,4% (4 l/ha)**		6513 6626	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	**33,50** **32,00** **149,50** **147,00**	33,50 32,00 29,90 29,40
MCPP Combi (Mecoprop-P 405 g/l, 2,4D 170 g/l) Herbizid für den Obstbau, Getreide, Wiesen und Weiden, Nichtkulturland und Rasen. **Anwendung: 1,5 - 2,5 l/ha**		6649	5 l 4 x 5 l	**105,00** **104,00**	21,00 20,80
Messbecher aus Polypropylen, mit 10ml Skala. **Inhalt 1 Liter oder 5 Liter**		6845 6744	1 l: Stk. 5 l: Stk.	**4,00** **15,00** **inkl. 7,7% MWST**	

Unverbindliche Richtpreise. Gültig ab 01.01.18, Preisänderungen vorbehalten.

Produkt		Art. Nr.	Verpackung	Richtpreis inkl. 2,5 % MWST	Preis je kg/l
Metamitron flüssig (Metamitron 700 g/l) Herbizid für Zucker- und Futterrüben. **Anwendung: 3 - 5 l/ha**		6647	5 l 4 x 5 l	**221,00** **220,00**	44,20 44,00
Metriphar 70 WG (Metribuzin 70%) Herbizid gegen Unkräuter und Ungräser im Kartoffelbau und Tomaten (Freiland). **Anwendung: 0,4 - 0,6 kg/ha**		6668	500 g 10 x 500 g	**47,50** **45,50**	95,00 91,00
Mixanil (Chlorothalonil 375 g/l, Cymoxanil 50 g/l) Teilsystemisches Fungizid gegen Kraut- und Knollenfäule im Kartoffelbau. Regenfest. **Anwendung: 2,4 l/ha**		6664	5 l 4 x 5 l	**110,00** **108,00**	22,00 21,60
Naceto (Flufenacet 400 g/l, Diflufenican 200 g/l) Kombiniertes Herbizid gegen einjährige Gräser und Unkräuter im Wintergretreide (ausser Hafer). **Anwendung: 0,4 - 0,6 l/ha**	Neu	6726 6745	1 l 10 x 1 l 3 l 4 x 3 l	**169,70** **167,60** **477,10** **476,60**	169,70 167,60 159,03 158,87
Napronol (Napropamid 450 g/l) Herbizid für Raps, Erdbeeren und Tabak. **Anwendung: 2 - 3 l/ha**		6721	5 l 4 x 5 l	**220,00** **219,00**	44,00 43,80
Napronol Top (Set: 5 l Napropamid 450 g/l + 2 l Metazachlor 500 g/l) Set für 2 ha zur Unkrautbekämpfung im Raps. **Anwendung: 3,5 l/ha**		6515	7 l	**310,00**	44,86
Napronol *plus* (Set: 5 l Napropamid 450 g/l + 0,5 l Clomazone 360 g/l) Set für 2 ha zur Unkrautbekämpfung im Raps. **Anwendung: 2,75 l/ha (im Vorauflauf)**		6838	5,5 l	**300,00**	54,55
Netzmittel S (Netz- und Haftmittel) Verbessert die Netz- und Haftfähigkeit von Spritzbrühen in allen Kulturen. Eignet sich auch zur Reinigung von Maschinen und Spritzgeräten. **Anwendung: 0,02 - 0,05%**		6661 6652 6615	1 l 10 x 1 l 5 l 10 l	**13,30** **12,30** **51,00** **99,50**	13,30 12,30 10,20 9,95
Oblix® 200 EC (Ethofumesate 200 g/l) Herbizid gegen diverse Unkräuter- und Ungräser in Spinat, Randen und im Zuckerrübenbau. **Anwendung: 0,5 - 6 l/ha**		6690	5 l 4 x 5 l	**128,70** **127,10**	25,74 25,42
Omazon (Clomazone 360 g/l) Vorauflauf-Herbizid gegen einjährige Unkräuter und Gräser in Raps, Eiweisserbsen und Kartoffeln. **Anwendung: 0,2 - 0,33 l/ha**		6765	500 ml 20 x 500 ml	**121,10** **119,50**	242,20 239,00
Orius Top (Prochloraz 200 g/l, Fenpropidin 150 g/l, Tebuconazole 100 g/l) Kombiniertes Fungizid für den Getreidebau. **Anwendung: 1,5 l /ha**		6522	5 l 4 x 5 l	**240,00** **239,00**	48,00 47,80
Phenmedipham EC (Phenmedipham 157 g/l) Herbizid für Zucker- und Futterrüben, Randen, Spinat und Erdbeeren. **Anwendung: 5 - 6 l/ha**		6675	5 l 4 x 5 l	**158,10** **157,00**	31,62 31,40

Unverbindliche Richtpreise. Gültig ab 01.01.18, Preisänderungen vorbehalten.

Produkt		Art. Nr.	Verpackung	Richtpreis inkl. 2,5 % MWST	Preis je kg/l
Phenmedipham SE (Phenmedipham 157 g/l) Herbizid für Zucker- und Futterrüben, Randen, Spinat und Erdbeeren. **Anwendung: 5 - 6 l/ha**		6674	5 l 4 x 5 l	**154,60** **154,10**	30,92 30,82
Pirimicarb 50 WG (Pirimicarb 50%) Nützlingschonendes Insektizid für den Obst-, Gemüse- und Feldbau sowie Zierpflanzen. **Anwendung: Obst- und Gemüsebau: 0,02 - 0,1%** **Feldbau: 0,15 - 0,25 kg/ha** **Zierpflanzen: 0,05%**		6666 6723 6669	500 g 10 x 500 g 1 kg 10 x 1 kg 3 kg 4 x 3 kg	**45,70** **44,30** **91,40** **88,60** **257,80** **257,30**	91,40 88,60 91,40 88,60 85,93 85,77
Pomstar Duplo (Set: 250 ml Difcor 250 EC + 2 kg Captan 80 WG) Set für 1 Hektare gegen Echten Mehltau, Schorf und andere Krankheiten im Stein- und Kernobstbau. **Anwendung: 0,25 l/ha + 1,6 kg/ha**		6528	Set 1 ha	**78,00**	
Prado™ (Pethoxamid 300 g/l, Terbuthylazin 187,5 g/l) Herbizid für den Vorauflauf und den frühen Nachauflauf gegen einjährige Unkräuter und Gräser in Maiskulturen. **Anwendung: 2,5 - 3 l/ha** **Ersatz für Successor T®**	Neu	6579	5 l 4 x 5 l	**134,50** **134,00**	26,90 26,80
Prochloraz 450 S (Prochloraz 464 g/l) Fungizid zur Kontrolle der Halmbruchkrankheit des Weizens, gegen die Netzflecken- und Blattfleckenkrankheit und echten Mehltau der Gerste und gegen trockene Molle der Speisepilze. **Anwendung: 1 l/ha**		6634	5 l 4 x 5 l	**227,00** **225,00**	45,40 45,00
Propaq (Propaquizafop 9,7%) Herbizid gegen Gräser für den Feld-, Obst-, Gemüse- und Gartenbau (Zierpflanzen). **Anwendung: 0,75 - 2,5 l/ha**		6757	1 l 10 x 1 l	**63,00** **60,50**	63,00 60,50
Proper Flo (Propyzamide 400 g/l) Selektives Bodenherbizid für den Feld-, Gemüse-, Obst-, Beeren- und Zierpflanzenbau. **Anwendung: 1,25 - 6,25 l/ha**		6508	5 l 4 x 5 l	**254,70** **254,20**	50,94 50,84
Proplant® (Propamocarb-Hydrochlorid 722 g/l) Systemisches Fungizid für den Gemüse- und Zierpflanzenbau. **Anwendung: 0,1 - 0,3%**		6622 6684	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	**67,00** **65,00** **302,00** **300,00**	67,00 65,00 60,40 60,00
Proxanil® (Propamocarb-Hydrochlorid 400 g/l, Cymoxanil 50 g/l) Kombiniertes systemisches Fungizid gegen Kraut- und Knollenfäule im Kartoffelbau. **Anwendung: 2,5 l/ha**		6796	5 l 4 x 5 l	**135,20** **134,70**	27,04 26,94
Pyridate 45 WP (Pyridate 45%) Kontaktherbizid gegen Unkräuter im Gemüse- und Feldbau. **Anwendung: 1 - 2 kg/ha**		6676	1 kg 10 x 1 kg	**63,40** **62,40**	63,40 62,40
Pyrinex® M22 (Chlorpyrifos-methyl, 225 g/l) Insektizid gegen fressende und saugende Insekten im Feld-, Obst-, Wein-, Gemüse- und Zierpflanzenbau. **Anwendung: 5 - 6 l/ha**		6814	5 l 4 x 5 l	**142,00** **141,50**	28,40 28,30

Unverbindliche Richtpreise. Gültig ab 01.01.18, Preisänderungen vorbehalten.

Produkt		Art. Nr.	Verpackung	Richtpreis inkl. 2,5 % MWST	Preis je kg/l
Pyrus® 400 SC (Pyrimethanil 400 g/l) Fungizid für den Obst-, Wein-, Gemüse-, Beeren- und Zierpflanzenbau. **Anwendung: 0,075 - 0,25%**		6603	5 l 4 x 5 l	**387,50** **385,00**	77,50 77,00
Rapsan 500 SC (Metazachlor 500 g/l) Bodenherbizid gegen einjährige Unkräuter und Ungräser im Raps, in Erdbeeren, im Gemüsebau und in Ziergehölze. **Anwendung: 0,5 - 2 l/ha**		6582 6587	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	**77,40** **75,70** **360,30** **359,80**	77,40 75,70 72,06 71,96
Ravane 50 (Lambda-Cyhalothrin 50 g/l) Insektizid für den Feld-, Gemüse-, Obst-, Beeren- und Zierpflanzenbau. **Anwendung: 0,02 - 0,04%**		6771	500 ml 10 x 500 ml	**41,50** **41,00**	83,00 82,00
RhizoVital®42 (Bacillus amyloliquefaciens 80%) BIO Kultur von Mikroorganismen zur Behandlung von Böden, Saatgut oder Pflanzen. **Anwendung: 0,5 - 2 l/ha**		6695	500 ml 10 x 500 ml	**85,00** **84,50**	170,00 169,00
Roxy EC (Prosulfocarb 800 g/l) Herbizid gegen Unkräuter und Ungräser in allen Getreidearten (ausser Hafer) sowie im Kartoffelbau. **Anwendung: 3 - 5 l/ha**		6511	10 l 2 x 10 l	**175,00** **173,00**	17,50 17,30
Schmierseife Natürlicher Allzweckreiniger. **Anwendung: 1 - 2 dl / 10 l Wasser**		6533	10 l	**46,60** **inkl. 7,7% MWST**	4,66
Schwefel 80 WG *Stulln* (Schwefel 80%) BIO Fungizid für den Beeren-, Obst-, Gemüse- und Weinbau, Hopfen und Zierpflanzen. **Anwendung: 0,1 - 2%**		6670 6727 6671	1 kg 10 x 1 kg 5 kg 4 x 5 kg 25 kg	**9,00** **8,50** **24,30** **23,80** **90,70**	9,00 8,50 4,86 4,76 3,63
Select® (Clethodim 240 g/l) Gräserherbizid für den Obst-, Wein, Gemüse- und Feldbau und Erdbeeren. Set-Packung 1 l Select + 2 l Raps-Öl. **Anwendung: 0,5 - 1 l/ha**		6599	1 l 5 x 1 l	**135,20** **134,00**	135,20 134,00
Speedy Allzweckstreuer für müheloses Streuen von Granulaten, Schneckenkörnern, Dünger, Streusalzen, Grassamen etc.		6602	Stk.	**195,00** **inkl. 7,7% MWST**	
Spirox (Spiroxamin 500 g/l) Fungizid gegen Echten Mehltau in Reben. **Anwendung: 0,8 l/ha.**		6760 6761	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	**54,10** **51,30** **238,90** **238,40**	54,10 51,30 47,78 47,68
Successor T® (Pethoxamid 300 g/l, Terbuthylazin 187,5 g/l) Herbizid für den Vorauflauf und den frühen Nachauflauf gegen einjährige Unkräuter und Gräser in Maiskulturen. **Anwendung: 2,5 - 3 l/ha** so lange Vorrat!	**Ersatz-produkt: Prado™**	6625	5 l 4 x 5 l	**134.50** **134,00**	26,90 26,80
Syllit® (Dodine 410 g/l) Fungizid mit vorbeugender und abstoppender Wirkung gegen Schorf im Kernobstbau. **Anwendung: 0,12% (1,92 l/ha)**		6683	1 l 12 x 1 l	**35,50** **33,60**	35,50 33,60

Unverbindliche Richtpreise. Gültig ab 01.01.18, Preisänderungen vorbehalten.

Produkt		Art. Nr.	Verpackung	Richtpreis inkl. 2,5 % MWST	Preis je kg/l
Tebucur 250 (Tebuconazole 250 g/l) Fungizid mit systemischen Eigenschaften für Raps, Roggen und Weizen. **Anwendung: 0,5 – 1,5 l/ha**		6685	5 l 4 x 5 l	**249,60** **249,10**	49,92 49,82
Tribel plus (Triclopyr 11,3% [103.6 g/l], 2,4-D 10,1% [93 g/l]) Selektives Herbizid gegen Blacken, Disteln und Brennnesseln auf Wiesen, Weiden, und Brachland. **Schont Gräser.** **Anwendung: 0,125 l in 10 l Wasser**		6828	1 l 12 x 1 l	**74,80** **73,20**	74,80 73,20
Trinexx Top (Trinexapac-ethyl 17,2% Emulsionskonzentrat) Formulierung E^3 Wachstumsregulator zur Halmverkürzung und Verbesserung der Standfestigkeit im Getreide. **Anwendung: 0,4 - 1 l/ha**		6768 6769	1 l 10 x 1 l 5 l 4 x 5 l	**92,00** **90,50** **421,30** **419,30**	92,00 90,50 84,26 83,86
Valis® M (Mancozeb 600 g/kg + Valifenalate 60 g/kg) Fungizid gegen Alternaria-Dürrfleckenkrankheit sowie Kraut- und Knollenfäule in Kartoffeln. **Anwendung: 2,5 kg/ha**		6753	5 kg 4 x 5 kg	**131,80** **131,30**	26,36 26,26
Vegoil+ (95% Rapsöl 875,9 g/l) Sehr verträgliches Netz- und Haftmittel für den Obst-, Wein-, Gemüse- und Feldbau sowie Zierpflanzen. **Anwendung: 1,2 - 2,5 l/ha**		6698 6689	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	**14,40** **13,60** **48,40** **47,90**	14,40 13,60 9,68 9,58
Weissöl S (Paraffinöl 830 g/l) BIO Insektizid und Akarizid (Winter- und Austriebsspritzmittel) für den Obst-, Beeren-, Zierpflanzen- und Weinbau. Auch gegen virusübertragende Blattläuse an Pflanzkartoffeln. Im Gemüse- und Feldbau: als Zusatz zu Herbiziden zur Erhöhung des Netz- und Haftvermögens. **Anwendung: 1 - 3,5%**		6665 6677 6688	5 l 20 l Fass 205 l	**40,30** **115,10** **1196,00**	8,06 5,75 5,83
Zwei-4D flüssig (2,4-D 496 g/l) Herbizid gegen breitblättrige Unkräuter in Getreide, Wiesen, Weiden, Böschungen und Grünstreifen. **Anwendung: 1,25 - 2,5 l/ha**		6692 6693	1 l 12 x 1 l 5 l 4 x 5 l	**19,80** **18,80** **82,10** **81,60**	19,80 18,80 16,42 16,32

Dosiertabelle

Beispiel: notwendige Konzentration 0,2 %
Brühmenge 300 Liter = 600 g Produkt

Konzentration in %

Spritzbrühe	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	
10 Liter	5	7.5	10	12.5	15	20	30	40	50	60	70	75	80	100	in Gramm oder cm^3
100 Liter	50	75	100	125	150	200	300	400	500	600	700	750	800	1	nötiges Quantum in kg oder Liter
200 Liter	100	150	200	250	300	400	600	800	1	1,2	1,4	1,5	1,6	2	
300 Liter	150	225	300	375	450	600	900	1,2	1,5	1,8	2,1	2,25	2,4	3	
400 Liter	200	300	400	500	600	800	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3	3,2	4	
500 Liter	250	375	500	625	750	1	1,5	2	2,5	3	3,5	3,75	4	5	
600 Liter	300	450	600	750	900	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,5	4,8	6	
700 Liter	350	525	700	875	1.05	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	5,25	5,6	7	
800 Liter	400	600	800	1	1,2	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,6	6	6,4	8	
900 Liter	450	675	900	1,125	1,35	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	6,75	7,2	9	
1000 Liter	500	750	1	1,25	1,5	2	3	4	5	6	7	7,5	8	10	
1200 Liter	600	900	1,2	1,5	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9	9,6	12	
1500 Liter	750	1,125	1,5	1,875	2,25	3	4,5	6	7,5	9	10,5	11,25	12	15	
2000 Liter	1	1,5	2	2,5	3	4	6	8	10	12	14	15	16	20	

Unverbindliche Richtpreise. Gültig ab 01.01.18, Preisänderungen vorbehalten.

HIMALAYA®

Wachstumsregulator für Kartoffeln und Zwiebeln

- Himalaya sorgt in Zwiebel und Kartoffel für eine bessere und längere Lagerfähigkeit
- Himalaya dient der Qualitätserhaltung der Marktware
- Himalaya erspart teure Lagertechnik
- Anwenderfreundliche Granulatformulierung!

... und im Lager herrscht Ruhe !

Gehalt:	60% Maleinsäurehydrazid
Formulierung:	Wasserlösliches Granulat SG
Verpackung:	5 kg

HIMALAYA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Arysta LIFESCIENCE Switzerland Sàrl

Schneiter AGRO AG

Produkte & Beratung für die Landwirtschaft

Getreide 2018

	Auflauf 00	3-Blatt-Stadium D13	Beginn Bestocken E21	Hauptbestockung F25	Ende Bestockung G29	Beginn Schossen H30	1-Knoten-Stadium I31	Fahnenblatt sichtbar H37	Beginn Ähren-schieben N51-61	Winterweizen	Wintergerste	Triticale	Roggen	Sommerweizen	Sommergerste	Hafer	Bemerkungen
Herbst: Einjährige Unkräuter und Ungräser	Naceto, 0,4 - 0,6 l/ha									X	X	X	X				Vorauflauf: bis 10. Oktober Nachauflauf bis Ende Oktober
		Diflanil 500 SC, 0,3 l/ha								X	X		X				Keine Anwendung bei Einsaaten.
Ackerfuchsschwanz, Flughafer		Mandolin 0,2 – 0,35 l/ha								X		X	X	X			Nicht in Gerste u. Hafer einsetzen.
Unkräuter, inkl. Blacken und Klebern		Finy 30 g/ha + Globus 0,15 l/ha								X	X	X	X	X	X		Keine Anwendung bei Einsaaten.
Klebern und Disteln			Globus 0,15 l/ha							X	X	X	X	X	X	X	Dreiblattstadium bis Fahnenblatt des Getreides.
Breitblättrige Unkräuter				MCPP Combi 2 - 5 l/ha						X	X	X	X	X	X	X	Einsaat von Kleegrasmischungen erst 6 Wochen nach der Spritzung möglich. Nicht IP Suisse.
Echter Mehltau, Braunrost, Zwergrost, Netzflecken- und Blattfleckenkrankheit, Septoria-Blattdürre							Orius Top 1,5 l/ha			X	X	X	X	X	X		Maximal 1 Behandlung pro Kultur. Teilwirkung gegen Sprenkelnekrosen.
Echter Mehltau, Gelbrost, Braunrost								Difcor 250 EC 0,5 l/ha		X				X			Max. 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr. (BBCH 32-62)
Halmbruch						Prochloraz 450 S 1 l/ha				X				X			Nicht mit Kontaktherbiziden oder Blattdüngern mischen.
Braunrost, Ährenfusariosen, Gelbrost, Echter Mehltau, Spelzenbräune, Braunfleckigkeit								Globaztar SC 1 l/ha		X	X	X	X	X	X		Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
Braunrost, Ährenfusariosen, Gelbrost, Echter Mehltau, Spelzenbräune, Braunfleckigkeit								Tebucur 250 1 l/ha		X			X	X			Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
Spelzenbräune, Braunfleckigkeit, Sprenkelnekrosen									Chlorotal 500 3 l/ha	X	X			X	X		In Mischungen 1,5 l/ha.
Zur Verbesserung der Standfestigkeit					CCC 0,5 - 1,5 l/ha					X		X		X		X	Bei Trockenheit Dosierung reduzieren.
Zur Halmverkürzung und Verbesserung Standfestigkeit						Trinexx Top 0,4 – 1 l/ha				X	X	X	X	X	X		Anwendung im Frühjahr. Nicht vor oder nach Nachtfrost und sehr hohen Temperaturen anwenden.
Zur Halmverstärkung								Ethefon S 0,5 - 1 l/ha		X	X	X	X				Nach der letzten Wuchsstoffanwendung min. 14 Tage mit der Anwendung von Ethefon S warten.
Zur Blattdüngung	Folio Micro 1 kg/ha									X	X	X	X	X	X	X	
Für bessere Kornausbildung								Impro-Set 0,6 l/ha		X	X	X	X	X	X	X	

Schneiter GRO AG

Rüben 2018

	Saat	Keimblatt	2-Blatt-Stadium	2 Blätter voll entfaltet	4-Blatt-Stadium	6-Blatt-Stadium	Juli - August	Bemerkungen
Vorauflauf: **Einjährige Unkräuter und Ungräser**	***Chloridazon 2-4 kg/ha**							Aufwandmenge je nach Bodenart. Keine Anwendung auf Moorböden.
	Lenacil 1,5-2 kg/ha							Keine Anwendung in sandigen und humusarmen Böden. Max. 1 Behandlung pro Kultur.
Nachauflauf: **Einjährige Unkräuter und Ungräser**			**BetaTeam** **1. Split 1,25 l/ha / 2. Split 1,5 l/ha (max. 4,25 l/ha)**					Kann mit Metamitron flüssig gemischt werden.
			Beta Super 3 **im Split 2-3 x je 3 l/ha (max. 9 l/ha)**					Abstand: 8-12 Tage. Enthält 3 Wirkstoffe und ist mit Rapsöl formuliert. Sehr verträglich.
			Beta Star **im Split je 1,5-2 l/ha (max. 6 l/ha)**					Abstand: 8-12 Tage.
			Phenmedipham EC oder SE **im Split 1-2 x je 1-3 l/ha (max. 6 l/ha)**					Sortenempfindlichkeit beachten.
			Lenacil **0,05 - 0,1*kg/ha**					in Mischung mit Beta Super 3. *Beratung anfordern.
			Metamitron flüssig **1 - 1,5 l/ha (max. 5 l/ha)**					In Mischung mit Beta Super 3 oder Beta Star anwenden.
			***Chloridazon 65 WG** **1-2 kg/ha**					Bei Bingelkräuter und Hirsearten anstelle von Metamitron flüssig in Mischung mit BetaSuper oder BetaStar anwenden. *Max. 2,6 kg/ha pro Parzelle.
Gräserarten					**Propaq** **1,5 – 2,5 l/ha**			Mischung gemäss Beratung. Wartefrist: 8 Wochen.
					Select® **0,5 - 1 l/ha + 1 - 2 l Öl**			Nicht mit anderen Produkten mischen. 0,5 l/ha gegen einjährige, 1 l/ha gegen mehrjährige Gräserarten.
Disteln, Hundspetersilie						**Clio 100** **1-1,2 l/ha + 2 l Öl**		Nur befallene Teilflächen behandeln. Maximal 1 Behandlung pro Jahr. Ab 8 Blattstadium.
Cercospora- und Ramularia-Blattflecken-krankheiten							**Difcor 250 EC** **0,5 l/ha**	In der Regel nur 1 Behandlung bei Befallsbeginn durchführen.
Erdflöhe, Erdraupen		**Ravane 50**** **0,15 l/ha**						Wartefrist: 6 Wochen. Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
Schnecken		**Duroschneck Longlife** **7 kg/ha**						Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.
Virusübertragende Blattläuse						**Pirimicarb 50 WG** **250 g/ha**		0,1% Netzmittel S beimischen. Max. 2 Behandlungen pro Kultur. Wartefrist: 6 Wochen.
Bormangel						**Bor 150 flüssig** **2-3 l/ha**		1 bis 2 Behandlungen mit je 2-3 l/ha.
Zur Blattdüngung			**Folio Micro** **1 kg/ha**					Mischen mit Impro-Set. Je eine Behandlung Ende Mai und Anfang August.
Für mehr Wurzelwachstum und Widerstandsfähigkeit			**Impro-Set** **0,6 l/ha**					Mischen mit Folio Micro. Je eine Behandlung Ende Mai und Anfang August.

* Zum Schutz von Grundwasser nicht mehr als 2,6 kg des Wirkstoffs Chloridazon pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von 3 Jahren anwenden. ** Nicht bewilligt im ÖLN.
Aktuelle Gewässerschutzabstandsauflagen gemäss BLW einhalten.

Mais 2018

	Saat	Auflaufen	2 Blätter	4 Blätter	6 Blätter	Bemerkungen
Rispen- und Raygräser, Hirsen, Quecken Diverse einjährige Unkräuter, inkl. Amaranten			MaisNico** 1 - 1,5 l/ha + Prado™ * 2,5 - 3 l/ha			Mischbar mit 0,4 - 0,5 l/ha Manivel 480 gegen mehrjährige breitblättrige Unkräuter; nur in wüchsigen Beständen. Mit Bodenherbizid, nicht in Karstgebieten. *Zum Schutz von Grundwasser Prado oder andere Terbuthylazin-haltige Pflanzenschutzmittel nicht mehr als 1 mal alle drei Jahre auf derselben Parzelle anwenden.
			MaisNico** 1 - 1,5 l/ha + Buthyl 1,5 - 2 l/ha			Mit Bodenherbizid, nicht in Karstgebieten.
Acker- und Zaunwinden			Globus 0,1 l/ha			Alleine oder in Kombination mit Maisherbiziden
Unkräuter (Winden, Disteln, Blacken)			MaisNico** 1 - 1,5 l/ha			Gegen Ungräser, speziell gegen Quecken. **Zum Schutz von Grundwasser nicht mehr als 60 g des Wirkstoffs Nicosulfuron pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von 2 Jahren anwenden. Nicht in Karstgebieten. Wasserabstandauflagen beachten. Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.
Winden, Blacken, Disteln			Manivel 480 0,5 l/ha			Speziell gegen Blacken. Nicht in Saat- oder Zuckermais anwenden. Sortenverträglichkeit beachten. Max. 6-Blattstadium des Maises.
Winden, Blacken, Disteln			Zwei-4D flüssig 1,25 l/ha			Anwendung bei einer Wuchsshöhe von min. 15 cm und max. 20 cm. Empfindliche Maissorten nicht behandeln.
Schnecken	Duroschneck Longlife 7 kg/ha					Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.

Eiweisserbsen 2018

	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Bemerkungen
Einjährige Unkräuter und Ungräser	Stomp Aqua®+ Bentazon 480 S	1 l/ha + 1,5 lt/ha	Im 2- bis 3-Blattstadium der Erbsen. Sortenempfindlichkeit abklären.
	Chanon	1-3 l/ha	Vorauflauf: 3 l/ha, Nachauflauf 1 l/ha. Gewässerschutzauflagen beachten.
Einjährige Unkräuter inkl. Disteln	MCPB 400	4 l/ha	Vor der Knospenbildung der Erbsen behandeln. Wartefrist: 3 Wochen
Gräserarten inkl. Quecken und einjähriges Rispengras	Propaq	0,75-2,5 l/ha	Vor der Erbsenblüte behandeln.
Blattläuse	Pirimicarb 50 WG	150 g/ha	Wartefrist: 2 Wochen. Max. 1 Behandlung pro Kultur.
Erbsenwickler, Erdraupen	Ravane 50	0,15 l/ha	max. 1 Behandlung pro Kultur. Abstandauflagen beachten.
Schnecken	Duroschneck Longlife	7 kg/ha	Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.

Wirkungstabelle Herbizide 2018

Einsatzgebiete									Produkte	Ungräser												
Getreide	Rüben	Mais	Soja	Kartoffeln	Raps	Weinbau	Obstbau	Wiesen/Weiden	**Wirkung:** gut = ■ mässig = □ Vorauflauf = V Nachauflauf = N	Ausfallgetreide	Ackerfuchsschwanz	Flughafer	Hirsen	Raygras	Rispengras	Quecke	Windhalm	Amarant	Bingelkraut	Ehrenpreis	Erdrauch	Franzosenkraut
							N	N	Asulam S													
N		N	N	N				N	Bentazon 480 S									■				■
	N								Beta Star	□	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■
	N								Beta Super 3	□	■	□	■	□	■		■	■	■	■	■	■
	N								BetaTeam	□	□	■	□		□		■	■	■	■	□	■
								N	Blackomat									■	■	■	■	■
		N							Buthyl		□		□		■			■	■	■	■	■
									Chanon		■	□	■	■	■		■	■	■	■	■	□
	N								Chloridazon 65 WG	□	■	□	□	□	■		■	■	■	■	□	■
	N							N	Clio 100													□
N									Diflanil 500 SC			□		□						□	□	□
				N		N	N	N	Diquat									■	■	■	■	■
						V	V		Diuron 80		■		□	□	□		■	■	■	■	■	□
N									Finy®										■	□		■
N		N						N	Globus												□	□
									Glyphosat 360 TF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	N								Lenacil	■	■		□	■	■		■			■		■
		N							MaisNico		■		■	■	■	■	■	■	□			
N									Mandolin		■	■		■	□	□	□					
N		N							Manivel 480									■		□	■	
N				N			N	N	MCPB 400									□				□
N							N	N	MCPP Combi									□		□	■	■
	N								Metamitron flüssig	□	□		□	□	■		■	■		□	■	■
				N					Metriphar 70 WG	■	■	□	■	■	■		■	□	□	■	■	■
V									Naceto		■	□		□	■		■			■	□	■
					V				Napronol	□	■	□	■		■		■	□	■	■	□	□
					V				Napronol *plus*	□	■	■	■	■	■		■	□	■	■	□	□
					V				Napronol Top	□	■	■	■	■	■		■	□	■	■	□	□
	N								Oblix®200 EC	□	■		■				■	■	■	□	□	
				V	V				Omazon				□		□			□	□	□		
	N								Phenmedipham											■	■	■
		N							Prado™				■		■			■				■
	N		N	N	N		N		Propaq	■	■	■	■	■	□	■	■					
					N		N		Proper Flo	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		
		N			N				Pyridate 45 WP									■	□	□	■	■
					V				Rapsan 500 SC	□	■	■	■	■	■		■		■	■	□	
V				V					Roxy EC		■			■	■		■		□	■		■
	N		N	N	N	N	N		Select®	■	■	■	■	■	■	■	■					
		N							Successor T®				■		■			■				■
									Tribel plus													
N		N					N	N	Zwei-4D flüssig									□	□	□	□	□


Einjährige Unkräuter
Ausdauernde Unkräuter
Gänsedistel
Hederich
Hellerkraut
Hirtentäschelkraut
Hohlzahn
Hundspetersilie
Kamille
Klebern (Labkraut)
Knöterich
Kreuzkraut
Melde (Gänsefuss)
Nachtschatten
Raps (Ausfall)
Senf
Stiefmütterchen
Taubnessel
Vergissmeinnicht
Vogelmiere
Windenknöterich
Blacke
Brennnessel
Hahnenfuss
Disteln
Weidenröschen
Sumpfkresse
Winde
Schachtelhalm

Soja 2018

	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Bemerkungen
Einjährige Unkräuter und Ungräser	Omazon	0,25 l/ha	Behandlung sofort bis 3 Tage nach der Saat. In reinen Sandböden nicht einsetzen.
Einjährige Unkräuter, speziell Klebern und Melden	Bentazon 480 S	2-4 l/ha	Nachauflauf.Splitbehandung mit 1-2 l/ha ist zu bevorzugen. Kontaktherbizid.
Gräserarten	Propaq	0,75-2,5 l/ha	Nachauflauf, ab 3-Blattstadium bis vor Beginn Blüte der Soja. Maximal 1 Behandlung pro Jahr.
Distelfalter	Deltaphar® 25 EC	0,3 l/ha	Maximal 1 Behandlung pro Kultur. Wartefrist: 2 Wochen. ÖLN nur mit Sonderbewilligung.
Blattläuse (Röhrenläuse)	Pirimicarb 50 WG	0,15 kg/ha	Wartefrist: 3 Wochen. Abstandsauflagen beachten.
Schnecken	Duroschneck Longlife	7 kg/ha	Bei nasser Witterung.

Sonnenblumen 2018

	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Bemerkungen
Einjährige Unkräuter und Ungräser	Chanon	3 l/ha	Vorauflauf. Gewässerschutzauflage beachten.
Gräserarten	Select®	0,5-1 l/ha +1- 2 l Rapsöl	Nachauflauf. Nicht mit anderen Herbiziden mischen. 0,5 l/ha gegen Hirsen und Ausfallgetreide, 1 l/ha gegen Quecken und andere Gräserarten. Maximal 1 Behandlung pro Jahr.
Schnecken	Duroschneck Longlife	7 kg/ha	Sofort nach der Saat. Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.

Raps 2018

	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Bemerkungen
Einjährige Unkräuter und Ungräser	Napronol Top	3,5 l/ha	**Top-Mischung:** im Vorauflauf, kann bis 10 Tage nach der Saat angewendet werden.
	Napronol *plus*	2,75 l/ha	**Top Mischung:** wenn möglich nur im Vorauflauf anwenden.
Gräserarten	Propaq	0,75-2,5 l/ha	Nachauflauf. Maximal 1 Behandlung pro Jahr.
	Select®	0,5 l/ha +1-2 l Rapsöl	Nachauflauf, ab 3-Blattstadium bis zum Beginn Bestockung der Gräser, unabhängig vom Entwicklungsstadium der Kultur. Maximal 1 Behandlung pro Jahr.
Breitblättrige Unkräuter	Pyridate 45 WP	2 kg/ha	Im Frühjahr (März - April) auf abgetrocknete Pflanzenbestände. Nicht mit anderen Herbiziden mischen.
Wurzelhals- und Stengelfäule (Phoma lingam)	Difcor 250 EC	0,5 l/ha	Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.
Rapskrebs (Weissstängeligkeit), Wurzelhals- und Stengelfäule	Tebucur 250	1-1,5 l/ha	
Blattwespen, Erdflöhe	Deltaphar® 25 EC	0,3 l/ha	Anwendung im Herbst. Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr. Abstandauflagen beachten.
	Cypermethrin S	0,25 l/ha	Anwendung im Herbst (1. Hälfte Oktober). ÖLN nur mit Sonderbewilligung. Max. 1 Behandlung pro Kultur und Jahr.
	Ravane 50	0,15 l/ha	
Stengelrüssler, Schotenrüssler	Cypermethrin S	0,25 l/ha	Teilwirkung auf Rapsschotengallmücke. Bis Stadium 59 (BBCH). Wartefrist: 6 Wochen. Max. 1 Behandlung pro Kultur und Jahr. Abstandsauflagen beachten.
	Ravane 50	0,15 l/ha	
Rapsglanzkäfer	Pyrinex® M22	1,5 l/ha	Anwendung im Knospenstadium vor der Blüte; bis Stadium 59 (BBCH). Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr. Auflagen beachten.
Schnecken	Duroschneck Longlife	7 kg/ha	Sofort nach der Saat. Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.
Zur Blattdüngung	Folio Micro	1 kg/ha	Als Zusatz zur Frühjahrsbehandlung.
	Flüssigdünger S	3-5 l/ha	

Kartoffeln 2018

	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Bemerkungen
Saatgutbehandlung	**RhizoVital®42**	500 ml/ha	Behandlung beim Auslagern, kurz vor oder beim Legen der Pflanzkartoffeln.
	Curon 250 SC	0,6 ml/kg Saatgut	= 600 ml / 1000 kg Saatgut Nur Feldanwendung. Gegen die Rhizoctonia-solani-Krankheit.
Einjährige Unkräuter und Ungräser	**Roxy EC** **+ Omazon** **+ Metriphar 70 WG**	4,0 l/ha + 0 25 l/ha + 0,6* kg/ha	Im Vorauflauf. ***Omazon nicht*** in sandigen oder humusarmen Böden anwenden. *Die Aufwandmenge darf insgesamt 540 g Metribuzin/ha pro Kultur nicht überschreiten. Abstandsauflagen!
	Metriphar 70 WG	0,5* kg/ha	Nachauflauf bis 5cm Staudenhöhe. Saatkartoffeln sowie die Sorten Agria, Charlotte, Mathilda, Iroise, Nicola, Ukama und Ostara vor dem Durchstossen behandeln. Frühkartoffeln nicht behandeln. *Maximal 540 g Metribuzin/ha pro Kultur.
	Chanon **+ Roxy EC** **+ Metriphar 70 WG**	2,0 l/ha + 2,5 l/ha + 0,5* kg/ha	Top-Mischung. **Vorauflauf.** Frühkartoffeln nicht behandeln. *Maximal 540 g/Metribuzin/ha pro Kultur. Aktuelle Abstandsauflagen beachten.
Gräserarten	**Propaq**	0,75-2,5 l/ha	Nachauflauf. Nicht mit anderen Produkten mischen. Wartefrist: 6 Wochen.
Kraut- und Knollenfäule, Alternaria-Dürrfleckenkrankheit	**Ibiza SC**	0,4 l/ha	Wirkt vorbeugend. Alle 7 bis 10 Tage während des Staudenwachstums und alle 10 bis 12 Tage nach dem Reihenschluss. Wartefrist: 3 Wochen, Frühkartoffeln 2 Wochen.
	Cymoxanil WG	0,27 kg/ha	In Tankmischung mit 2,4 l/ha Chlorotal 500.
	Mancozeb-Cymox	3 kg/ha	Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Wartefrist: 3 Wochen. Bei Frühkartoffeln 2 Wochen.
	Chlorotal 500	3 l/ha	Sehr regenbeständig. Alle 8-12 Tage. Wartefrist: 3 Wochen, Frühkartoffeln 2 Wochen.
	Valis® M	2,5 kg/ha	Teilsystemisch. Alle 7-10 Tage. Wartefrist: 2 Wochen, Frühkartoffeln 1 Woche.
Kraut- und Knollenfäule	**Curenox 50 WG**	5-7 kg/ha	Abschlussbehandlung. Spritzabstände 7-10 Tage zu anderen Kontaktfungiziden. Max. eine Behandlung pro Jahr (3,5 kg Cu/ha). Wartefrist: 3 Wochen, Frühkartoffeln 2 Wochen.
	Mixanil	2,4 l/ha	Alle 7-10 Tage. Wartefrist: 3 Wochen, für Frühkartoffeln 2 Wochen.
	Proxanil® (Systemisch)	2,5 l/ha	Alle 7-10 Tage. Maximal 6 Behandlungen. Wartefrist: 3 Wochen, Frühkartoffeln 2 Wochen.
	Cuprum Flow	4,2 l/ha	Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr. Wartefrist: 3 Wochen. Für Frühkartoffeln: 2 Wochen
Alternaria-Dürrfleckenkrankheit	**Difcor 250 EC**	0,5 l/ha	Anwendung ab Befallsbeginn. Wartefrist: 3 Wochen, für Frühkartoffeln 1 Woche. Maximal 4 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Gewässerschutzauflage beachten.
	Globaztar SC	0,75 l/ha	Anwendung vorbeugend bei vollem Krautwachstum. Spritzabstände 7-10 Tage. Wartefrist 1 Woche. Frühkartoffeln 2 Wochen. Maximal 3 Behandlungen pro Kultur mit Produkten aus der Wirkstoffgruppe FRAC C3 (u.a. Strobilurine).
Schnecken	**Duroschneck Longlife**	7 kg/ha	Vor oder sofort nach dem Stauden abbrennen. Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.
Stauden abbrennen	**Diquat**	2,5-4,8 l/ha	Pflanzkartoffeln: 2,5 l/ha in 300-600 l Wasser. 4,5 l/ha bei Beginn der Abbrennperiode und 3,6-4,8 l/ha bei Hauptabbrennperiode.
Zur Blattdüngung	**Folio Micro**	1 kg/ha	Als Zusatz zu Fungiziden.
Zur Keimhemmung (Knollengrösse: mind. 25mm)	**Himalaya® 60 SG**	5 kg/ha	Späteste Anwendung: 21 Tage vor der Ernte.
Pflanzenstimulator	**Impro-Set** (Crop-Set)	0,6 l/ha	Mit 200-500 l Wasser/ha.

IMPRO SET®
Eine natürliche Alternative

Behandlungszeitpunkte:

Kartoffeln, Sorten mit schwachem Knollenansatz: z.B.: Agria, Desirée:
1. Beim Pflanzen direkt auf die Pflanzkartoffeln (Beizung bei Pflanzung) und in die Furchen spritzen. 2. Behandlung: Wenn die Stolonen zu wachsen beginnen.
Kartoffeln, Sorten mit hohem Knollenansatz z.B.: Charlotte:
1. Beim Pflanzen direkt auf die Pflanzkartoffeln (Beizung bei Pflanzung) und in die Furchen spritzen. 2. Behandlung: Wenn 50% der neuen Kartoffeln einen Durchmesser von über 2 cm aufweisen.

Gemüsebau 2018

Kohlgewächse	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Wartefrist	Bemerkungen
Unkräuter und Ungräser	**Rapsan 500 SC**	1,2-2 l/ha		Direkt nach dem Pflanzen auf unkrautfreien, feuchten Boden (keine Blattwirkung). Nicht vor Starkregen spritzen. Abstandsauflagen beachten. Grundwasserschutz: nicht mehr als 1 kg des Wirkstoffs Metazachlor pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von 3 Jahren anwenden.
Unkräuter	**Pyridate 45 WP**	2 kg/ha	4 Wochen	Nicht mit Adjuvanten (Netzmittel) oder Blattdüngern mischen. Behandlung sobald die Kulturen gut eingewurzelt sind (3-4 Wochen).
Schwarzbeinigkeit, Auflaufkrankheiten	**Mancozeb 75 WG**	0,2-0,3%		Nur zur Anzucht von Setzlingen.
Kohlschwärze (Alternaria), Graufäule	**Iprodion 500**	0,6-1,6 l/ha	3 Wochen	Max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Blattfleckenpilze, Kohlschwärze	**Difcor 250 EC**	0,5 l/ha	2 Wochen	Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
Echter Mehltau, Falscher Mehltau, Ringflecken, weisser Rost, Blattfleckenpilze	**Globaztar SC**	1 l/ha	2 Wochen	Ab Befallsbeginn. Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 3 Behandlungen pro Kultur mit Produkten aus der Wirkstoffgruppe FRAC C3 (u.a. Strobilurine).
Erdflöhe, Erdraupen, Eulenraupen	**Cypermethrin S**	0,25 l/ha	2 Wochen	Kontaktinsektizid. Max. 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Wirkstoff.
Blattfressende Eulenraupen, gefleckter Kohltriebrüssler, Kohldrehherzgallmücke, Kohlgallenrüssler und Weisslinge.	**Deltaphar® 25 EC**	0,3 l/ha	2 Wochen	Kontakt- und Frassinsektizid. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Wirkstoff.
Erdflöhe, Kohleulen, Kohlschaben, Kohlweisslinge, Blattläuse, Thripse, Weisse Fliegen, Kohldrehherzgallmücke	**Ravane 50**	0,2 l/ha	2 Wochen	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Wirkstoff. Behandlungen im Abstand von 7 - 14 Tagen.
Mehlige Kohlblattläuse (Blattläuse)	**Pirimicarb 50 WG* + Netzmittel S**	0,5 kg/ha + 0,1%	1 Woche	*Max. 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt. Abstandsauflagen beachten.
Zur Wachstumsförderung	**Impro-Set** (Crop-Set)	0,6 l/ha		Zur Pflanzenstärkung von Weiss- und Rotkabis und Wirz. Anwendung einen Monat nach der Pflanzung.
Spurenelementmangel	**Folio Micro**	1 kg/ha		Für Freiland-Kulturen. Mischbar mit Insektiziden und Fungiziden.

Lauch (gepflanzt)	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Wartefrist	Bemerkungen
Gräserarten	**Propaq**	0,75–1,25 l/ha	8 Wochen	
	Select®	0,5-1 l/ha +1-2 l Rapsöl	4 Wochen	Nachauflauf. Nicht mit anderen Produkten mischen. 0,5 l/ha gegen einjährige, 1 l/ha gegen mehrjährige Gräserarten.
Ein- und mehrjährige Unkräuter	**Pyridate 45 WP**	2 kg/ha	4 Wochen	Im Nachauflauf ab BBCH 13.
Rostpilze, Samtfleckenkrankheit	**Difcor 250 EC**	0,5 l/ha	3 Wochen	Gegen Rostpilze ist meistens keine Behandlung notwendig. Gewässerschutzauflage beachten. Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Papierfleckenkrankheit, Alternaria-Purpurfleckenkrankheit	**Globaztar SC**	1,0 l/ha	2 Wochen	Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 3 Behandlungen pro Kultur mit Produkten aus der Wirkstoffgruppe FRAC C3 (u.a. Strobilurine).
Lauchmotten, Thripse, Erdraupen	**Cypermethrin S**	0,25 l/ha	2 Wochen	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.
Thripse	**Deltaphar® 25 EC**	0,3 l/ha	2 Wochen	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.
Lauchmotten, Minierfliegen, Thripse	**Ravane 50**	0,2 l/ha	2 Wochen	Maximal 3 Behandlungen pro Kultur. Im Abstand von 7 - 14 Tagen.

Hinweis: Bitte die aktuellen Abstandsauflagen beachten.

Gemüsebau 2018

Karotten	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Wartefrist	Bemerkungen
Einjährige Unkräuter	Chanon	2-2,5 l/ha	70 Tage	1 – 1,5 l/ha im Vorauflauf (unmittelbar nach der Saat) plus 1 l/ha im Nachauflauf (BBCH 13).
	Condoral SC (L+G)	0,1-0,2 l/ha		Nach dem Auflaufen. Ab 3. echtem Blatt der Karotten. Pro Splitbehandlung, maximale Ausbringmenge 0,35 l/ha.
Gräserarten	Propaq	0,75-2,5 l/ha	4 Wochen	
Alternaria, Möhrenschwärze	Iprodion 500	0,6-1,6 l/ha	3 Wochen	Max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
	Mancozeb 75 WG	2-4 kg/ha	3 Wochen	
	Chlorotal 500	0,3%	3 Wochen	
	Difcor 250 EC	0,5 l/ha	2 Wochen	Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr .
	Globaztar SC	1 l/ha	2 Wochen	Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 3 Behandlungen pro Kultur mit Produkten aus der Wirkstoffgruppe FRAC C3 (u.a. Strobilurine).
	Cuprum Flow	7,5 – 12 l/ha	3 Wochen	In Tankmischung mit organischen Fungiziden genügt die Hälfte der aufgeführten Konzentration.
Eulenraupen (blattfressend)	Pyrinex (L+G)	3 l/ha	2 Wochen	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.
Möhrenfliegen	Cypermethrin S	0,25 l/ha	4 Wochen	Behandlungen nur während dem Flug (gemäss kritischer Fangzahl) im Abstand von mindestens 7 Tagen.
	Deltaphar® 25 EC	1 l/ha	4 Wochen	
Blattläuse, Möhrenblattflöhe	Deltaphar® 25 EC	0,3 l/ha	2 Wochen	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.
Blattläuse, Möhrenblattflöhe, Thripse, Möhrenfliegen, Erdraupen	Ravane 50	0,2 l/ha	2 Wochen	Behandlungen im Abstand von 7 - 14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt oder einem anderen Produkt, das diesen Wirkstoff enthält.
Zur Pflanzenstimulierung	Impro-Set	0,6 l/ha		Im 6-Blattstadium der Kultur, evtl. nochmals nach 4 bis 6 Wochen.
Spurenelementmangel	Folio Micro	1 kg/ha		Im Freiland-Gemüsebau. Mischbar mit unseren Produkten.

Knollensellerie	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Wartefrist	Bemerkungen
Einjährige Unkräuter und Ungräser	Chanon	2 l/ha	90 Tage	Anwendung nach dem Anwachsen der Kultur, ca. 7 Tage nach der Pflanzung. Risiko von vorübergehenden Blattchlorosen unmittelbar nach der Behandlung.
Gräserarten	Propaq	0,75-2,5 l/ha	8 Wochen	Splitbehandlungen möglich.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	Mancozeb 75 WG	2-3 kg/ha	3 Wochen	
	Difcor 250 EC	0,5 l/ha	2 Wochen	Maximal 4 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
	Chlorotal 500	3,0 l/ha	3 Wochen	
	Cupro-Folpet flüssig	2,5 l/ha	3 Wochen	Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je ha + Jahr.
	Globaztar SC	1 l /ha	2 Wochen	Maximal 3 Behandlungen pro Kultur.
Eulenraupen (blattfressend)	Pyrinex (L+G)	3 l/ha	2 Wochen	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.
Möhrenfliegen	Cypermethrin S	0,25 l/ha	4 Wochen	Behandlungen nur während dem Flug (gemäss kritischer Fangzahl) im Abstand von mindestens 7 Tagen.
Erdraupen	Deltaphar® 25 EC	0,5 l/ha	2 Wochen	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt.
Zur Ergänzung zur Grunddüngung und gegen sichtbare Mangelerscheinungen	Flüssigdünger S	3-4 l/ha		Den Insektizidbehandlungen kann anstelle von Netzmittel auch Flüssigdünger zugesetzt werden. Fördert Wachstum und Blattgrün und vermindert Wachstumsdepressionen in Stress-Situationen.
Herzfäule	Bor 150 flüssig	2 l/ha		Konzentration von 0,2% nicht überschreiten.
Spurenelementmangel	Folio Micro	1 kg/ha		Im Freiland-Gemüsebau. Mischbar mit unseren Produkten.

Gemüsebau 2018

Zwiebeln

Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Wartefrist	Bemerkungen
Einjährige Unkräuter und Ungräser	**Chanon**	3 l/ha		Anwendung im Vorauflauf ***(nur Zwiebeln gesteckt)***. Keine Anwendung auf Sandböden.
Gräserarten	**Select®**	0,5 l/ha + 1-2 l Rapsöl	8 Wochen	
	Propaq	0,75-2,5 l/ha	8 Wochen	
Falschen Mehltau, Purpurflecken, Rost und Samtfleckenkrankheit. Teilwirkung gegen Botrytis spp.	**Ibiza SC**	0,5 l/ha	7 Tage	Anwendung ab Befallsrisiko. Maximal 3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Gewässerschutzauflagen beachten.
Rostpilze, Samtfleckenkrankheit, Alternaria spp., Purpurflecken	**Difcor 250 EC**	0,5 l/ha	2 Wochen	Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Falscher Mehltau	**Globaztar SC**	1,0 l/ha	2 Wochen	Maximal 3 Behandlungen pro Kultur.
	Mancozeb-Cymox	2-3 kg/ha	3 Wochen	
	Chlorotal 500	3 l/ha	3 Wochen	
Graufäule (Botrytis)	**Pyrus® 400 SC**	2 l/ha	3 Wochen	Max. 1 Behandlung pro Kultur.
Minierfliegen	**Cypermethrin S**	0,25 l/ha	2 Wochen	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.
Thripse	**Deltaphar® 25 EC**	0,3 l/ha	2 Wochen	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.
Lauchmotten, Minierfliegen, Thripse	**Ravane 50**	0,2 l/ha	2 Wochen	Behandlungen im Abstand von 7 - 14 Tagen. Maximal 3 Behandlungen pro Kultur.
Zur Wachstumsförderung	**Impro-Set**	0,6 l/ha		Im 6- bis 8-Blattstadium anwenden. Ergibt 10 - 15% Mehrertrag.
Zur Keimhemmung	**Himalaya® 60 SG**	3,75-4 kg/ha	2 Wochen	spätestens 2 Wochen vor dem Roden.

Randen

Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Wartefrist	Bemerkungen
Einjährige Unkräuter und Ungräser	**Chloridazon 65 WG**	*2-4 kg/ha		Vorauflauf. Aufwandmenge je nach Bodenart. Keine Anwendung auf Moorböden. *Nicht mehr als 2,6 kg Wirkstoff pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von 3 Jahren anwenden..
	BetaTeam	1,25-1,5 l/ha		1. Split 1,25 l/ha, 2. Split 1,5 lt/ha.
Gräserarten	**Propaq**	0,75-2,5 l/ha	8 Wochen	
Blattfleckenkrankheiten (Cercospora, Ramularia)	**Difcor 250 EC**	0,5 l/ha	2 Wochen	Nach dem Auftreten erster Flecken. Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
	Curenox 50 WG	0,5-0,7%	3 Wochen	Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.
	Cuprum flow	7,5-12 l/ha	3 Wochen	In Tankmischung mit organischen Fungiziden genügt die Hälfte der aufgeführten Konzentration.
	Bordeaubrühe WG	13-18 kg/ha	3 Wochen	
Erdraupen	**Deltaphar® 25 EC**	0,05% (0,5 l/ha)	2 Wochen	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt. Aktuelle Wasserabstandsauflagen beachten.
Blattläuse (Röhrenläuse)	**Pirimicarb 50 WG**	0,5 kg/ha	1 Woche	
Blattläuse, Minierfliegen	**Ravane 50**	0,2 l/ha	2 Wochen	Max. 2 Behandlungen pro Kultur, im Abstand von 7-14 Tagen.
Nährstoffmangel	**Flüssigdünger S**	3-4 l/ha		Mischbar mit Insektiziden und Fungiziden.
Bormangel	**Bor 150 flüssig**	3-5 l/ha		
Spurenelementmangel	**Folio Micro**	1 kg/ha		Bei Bedarf wiederholen.

Nüsslisalat

Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Wartefrist	Bemerkungen
Unkräuter	**Diquat**	3 l/ha		Vor dem Auflaufen der Kultur.
Alternaria spp., Graufäule (Botrytis spp.)	**Iprodion 500**	5 ml/kg Saatgut		Beizung vor der Saat.
		1 l/ha	3 Wochen	Anwendung bei Befallsbeginn. Maximal 1 Behandlung.
Echter Mehltau	**Difcor 250 EC**	0,5 l/ha		Anwendung vor oder unmittelbar nach der Pflanzung, spätestens im 4-Blattstadium. Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle+Jahr.
Erdraupen	**Deltaphar® 25 EC**	0,05% (0,5 l/ha)	2 Wochen	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt.
Blattläuse, Minierfliegen, Thripse	**Ravane 50**	0,2 l/ha	3 Wochen	Behandlungen im Abstand von mindestens 7 Tagen. Max. 2 Behandlungen pro Kultur.
Blattläuse (Röhrenläuse)	**Pirimicarb 50 WG**	0,5 kg/ha	1 Woche	Spritzen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt.

Gemüsebau 2018

Tomaten	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Wartefrist	Bemerkungen
Einjährige Unkräuter und Ungräser	Metriphar 70 WG	0,4 kg/ha		Nur im Freiland. Anwendung 7-10 Tage nach der Pflanzung.
Alternaria spp., Kraut- und Fruchtfäule, Septoria	Mancozeb-Cymox	0,2-0,3%	3 Wochen	
	Cuprum Flow	0,75-1,2%	3 Tage	In Tankmischung mit organischen Fungiziden genügt die Hälfte der aufgeführten Konzentration.
Kraut- und Fruchtfäule, Echter Mehltau, Alternaria	Globaztar SC	0,1%	3 Tage	Maximal 3 Behandlungen pro Kultur. Abdrift vermeiden.
Alternaria, Septoria, Echter Mehltau	Difcor 250 EC	0,05%	3 Tage	Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Alternaria	Mancozeb 75 WG	0,2-0,3%	3 Wochen	
Dürrfleckenkrankheit	Iprodion 500	0,1%	3 Tage	Ab Blütebeginn.
	Chlorotal 500	0,3%	3 Wochen	
	Cupro-Folpet flüssig	0,2-0,3%	3 Tage	Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.
Graufäule (Botrytis)	Iprodion 500	0,1%	3 Tage	Max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Sclerotinia-Fäule, Graufäule	Pyrus® 400 SC	0,125%	3 Tage	Nur im Gewächshaus bewilligt. Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	Mancozeb 75 WG	0,2-0,3%	3 Wochen	
Echter Mehltau	Schwefel 80 WG *Stulln*	0,1-0,2%	3 Tage	
Eulenraupen (Junge Raupen)	Pyrinex® M22	0,35% (3,5 l/ha)	3 Tage	Nur im Gewächshaus bewilligt.
Blattläuse, Minierfliegen, Thripse, Erdraupen	Ravane 50	0,02%	3 Tage	Behandlungen im Abstand von 7 - 14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.

Kopfsalat, Eisberg, Lattich, Batavia	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Wartefrist	Bemerkungen
Einjährige Unkräuter und Ungräser	Proper Flo	2,5-3,75 l/ha		Nur Freiland. Nach der Saat oder Pflanzung.
Falschen Mehltau	Contender 80 WG	2 kg/ha	3 Wochen	Nur für Kopfsalate. Anwendung: spritzen.
	Mancozeb-Cymox	1,6 kg/ha		Nur Kopfsalate. Zur Anzucht von Jungpflanzen und bis spätestens 14 Tage nach der Pflanzung an den definitiven Standort.
	Proplant®	0,6-1,5 l/ha	3 Wochen	Anwendung: spritzen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.
Graufäule (Botrytis)	Iprodion 500	0,1%		Bis spätestens 14 Tage nach der Pflanzung. Max. 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.
Sclerotinia-Fäule, Graufäule (Botrytis)	Pyrus® 400 SC	2 l/ha		Zur Anzucht von Jungpflanzen und Setzlingen, letzte Anwendung spätestens 14 Tage nach der Pflanzung an den definitiven Standort. Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
Marssonina-Blattfleckenkrankheit, Ringfleckenkrankheit	Difcor 250 EC	0,5 l/ha	3 Wochen	Nicht bewilligt für Lattich. Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Falschen Mehltau, Rhizoctonia	Globaztar SC	1 l/ha	3 Wochen	Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Salatwurzellaus (Gewächshaus)	Pirimicarb 50 WG	0,1% (5 g/m²)	6 Wochen	Überbrausen. Nur zur Produktion von Setzlingen für gepflanzte Kulturen. Max. 1 Behandlung pro Kultur mit diesem Wirkstoff. Anwendung: Juni - August.
Blattläuse, Minierfliegen, Thripse, Erdraupen	Ravane 50	0,2 l/ha	1 Woche	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt. Behandlungen im Abstand von 7 - 14 Tagen.

Knollenfenchel	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Wartefrist	Bemerkungen
Einjährige Unkräuter und Ungräser	Chanon	2 l/ha	70 Tage	Unmittelbar vor der Pflanzung. Risiko von vorübergehenden Blattchlorosen.
Einjährige Ungräser	Propaq	1 l/ha	4 Wochen	
Falschen Mehltau, Blattfleckenkrankheiten	Globaztar SC	1 l/ha	1 Woche	Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 3 Behandlungen pro Kultur mit Produkten aus der Wirkstoffgruppe FRAC C3 (u.a. Strobilurine).
Blattläuse, Möhrenblattflöhe, Thripse, Erdraupen, Minierfliegen	Ravane 50	0,2 l/ha	2 Wochen	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur . Behandlungen im Abstand von 7 - 14 Tagen.

Gemüsebau 2018

Gurken (gedeckt)	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Wartefrist	Bemerkungen
Gummistängelkrankheit	**Difcor 250 EC**	0,05%	3 Tage	Bei Befallsbeginn kranke Pflanzen(teile) entfernen. Max. 4 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Echter Mehltau	**Globaztar SC**	1 l/ha	3 Tage	maximal 2 Behandlungen pro Kultur
	Schwefel 80 WG *Stulln*	0,1-0,2%	3 Tage	
Eckige Blattfleckenkrankheit, Falscher Mehltau (Teilwirkung)	**Curenox 50 WG**	0,2%	3 Wochen	Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr. Vorsicht wegen Phytotoxizität!
Graufäule (Botrytis)	**Iprodion 500**	0,1%	3 Tage	Kranke Pflanzen entfernen. Anwendung ab Beginn Blüte. Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Sclerotinia-Fäule, Graufäule (Botrytis)	**Pyrus® 400 SC**	0,125%	3 Tage	Kranke Pflanzen entfernen. Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
Blattläuse	**Pirimicarb 50 WG**	0,05%	1 Woche	Spritzen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt.
	Cypermethrin S	0,025%	3 Tage	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt.
Blattläuse, Minierfliegen, Thripse	**Ravane 50**	0,02%	3 Tage	Max. 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 7-14 Tagen.
Weisse Fliegen	**Cypermethrin S**	0,025%	3 Tage	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt.

Spinat	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Wartefrist	Bemerkungen
Einjährige Unkräuter und Ungräser	**Oblix®200 EC**	2 l/ha		In Mischung mit 0,6 kg/ha Lenacil. Nur Freiland. Anwendung: 1 Behandlung im Vorauflauf. Stadium 00-09 (BBCH). Keine Anwendung im Herbst und im Winter. Auf leichten Böden besteht die Gefahr von Schäden an der Kultur.
Einjährige Unkräuter	**Lenacil**	0,6 kg/ha		In Misching mit 2l/ha Oblix. Bis 2 Tage nach der Saat. Achtung: Einschränkungen bei Folgekulturen. Maximal 1 Behandlung pro Kultur. Sandige und humusarme Böden dürfen nicht behandelt werden. Dosierung nach Bodenart.
	Phenmedipham SE	1-2 l/ha	3 Wochen	1. Behandlung im Keim- bis Zweiblatt-Stadium der Unkräuter (1 l/ha). 2. Behandlung 5-7 Tage später (2 l/ha).
Thripse, Erdflöhe, Minierfliegen, Läuse	**Ravane 50**	0,2 l/ha	1 Woche	Max. 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 7-14 Tagen.
Erdraupen	**Deltaphar® 25 EC**	0,05% (0,5 l/ha)	2 Wochen	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt/Wirkstoff.
Spurenelementmangel	**Folio Micro**	1 kg/ha		Bei Bedarf wiederholen.
Zur Blattdüngung	**Schwefel 80 WG** *Stulln*	4 kg/ha		

Alle Kulturen	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Wartefrist	Bemerkungen
Bodenbürtige Pilzkrankheiten	**Mancozeb 75 WG**	0,2-0,3%		Nur für Keimlinge und zur Anzucht von Jungpflanzen. Nur im Spritz- oder Sprühverfahren, nicht angiessen.
Keimlingskrankheiten	**Proplant®**	10 ml unverdünnt pro kg Saatgut		Saatgutbeizung.
		5-10 ml/m²		Aussaaten / Saaterde überbrausen.
		7,5-15 ml/m²		Jungpflanzen nach dem Pikieren giessen.
Erdraupen	**Cypermethrin S**	0,25 l/ha	2 Wochen	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt. Abstandsauflagen beachten.
Diverse Schädlinge	**Deltaphar® 25 EC**	0,03-0,05%		Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.
Schnecken	**Duroschneck Longlife**	7 kg/ha		Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen. Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.
Zur Blattdüngung	**Flüssigdünger XL**	2-5 l/ha		
	Flüssigdünger Ca	4-6 l/ha		Calciumreicher Blattdünger
Wachstumsförderung	**Impro-Set** (Crop-Set)	0,6 l/ha		Höhere Erträge und widerstandsfähigere Pflanzen. Anwendungszeitpunkt je nach Kultur.

Hinweis: Beachten Sie bitte auch die Internet-Datenbank dataphyto.acwonline.ch, die ÖLN-Anforderungen, die Anforderungen der Vertragspartner und der kantonalen Beratungsstellen.

Weinbau 2018

	Grünpunkt B/C	2/3	E/F 6-Blatt 10/12	Schosse 20-30 cm	Blüte I 23	vor Trauben-schuss	15. August	Bemerkungen
Unkrautbekämpfung	Glyphosat 360 TF 4 - 10 l/ha							Unbedingt Kontakt mit der Rebe vermeiden. Keine Reben mit niederen Schnittsystemen behandeln.
	Diquat 3 - 5 l/ha							Ab 1. Standjahr.
	Diuron 80 2,5 kg/ha							Nur als Reihenbehandlung. Mindestens 4-jährige Anlage.
Falscher Mehltau		Chlorotal 500 3 l/ha oder 0,3%						Nur Vorblütebehandlungen. Schont Raubmilben.
			Folpet 80 WDG 2 kg/ha oder 0,125%		Curenox 50 WG 1 - 2 kg/ha oder 0,1 - 0,3%			Mischung Folpet 80 WDG und Curenox 50 WG möglich. Nach der Blüte bis spätestens Mitte August. Max. 6 kg Kupfer-Metall je ha und Jahr; innert 5 aufeinanderfolgender Jahre max. 20 kg Kupfer-Metall je Hektar (Kupferbilanzierung).
					Cupro-folpet flüssig 4,8 l/ha oder 0,3%			Nach dem Abblühen bis spätestens Mitte August. Kupferbilanzierung beachten!
					Cuprum Flow 2,4 l/ha oder 0,15%			Teilwirkung: Echter Mehltau u. Graufäule. Nebenwirkung auf Rotbrenner. In Tankmischung mit Folpet-haltigen Präparaten. Kupferbilanzierung beachten! Nach der Blüte, bis spätestens Mitte August.
Echter Mehltau		Schwefel 80 WG *Stulln* 1,6 - 6,4 kg/ha oder 0,1 - 0,4%						Höhere Aufwandmengen bei starkem Befallsdruck. Wartefrist: 3 Wochen.
			Difcor 250 EC 0,2 l/ha oder 0,0125%					Gegen Rotbrenner in Mischung mit Folpet 0,1%. Maximal 3 Anwendungen pro Parzelle und Jahr.
				Spirox 0,8 l/ha oder 0,05%				Keine Behandlung von Tafeltrauben. Maximal 4 Behandlungen pro Parzelle+Jahr. Auflagen beachten!
Graufäule (Botrytis cinerea)					Pyrus® 400 SC 2,4 l/ha oder 0,2%			Letzte Behandlung bei Beginn des Farbumschlags, jedoch spätestens Mitte August. Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.
Echter und Falscher Mehltau, Rotbrenner, Schwarzfleckenkrankheit, Graufäule		Ibiza SC 1,2 l/ha oder 0,1%						Bis spätesten beim Abblühen einsetzen. Max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Keine Behandung von Tafeltrauben. Auflagen beachten!
Kräusel- und Pockenmilben		Schwefel 80 WG 16 kg/ha						Anwendung: Austriebsspritzung
Traubenwickler, Zikaden (2. Generation)						Pyrinex®M22 2,4 - 3,2 l/ha oder 0,2%		Nach Bedarf. Nur Nachblütebehandlungen. Rebzikade: Behandlung nur auf Anweisung der Kantonalen Pflanzenschutzdienste. Auflagen beachten.
Zur Düngung				Flüssigdünger S 2 - 5 l/ha				Zu Fungiziden nach der Blüte.
				Folio Micro 1 - 2 kg/ha				
					Bittersalz microtop 1%			Reduziert Stiellähme. 3-4 Behandlungen. Alleine spritzen, nicht mischen.
Nach Hagelschlag					Folpet 80 WDG 0,15%			Anwendung spätestens 24 Stunden nach dem Hagelschlag.

Schneiter GRO AG

Kernobstbau 2018

1 ha = 100 Hochstämme = 2000 l 1 ha Niederstämme = 400 l	Grünpunkt B/C März	D/E April	Blüte F Mai	G-H Juni	I/J Juli	K August	Bemerkungen
Echter Mehltau, Schorf, Birnengitterrost, Blüten- und Zweigdürre		**Difcor 250 EC* 0,015% / 0,24 l/ha oder Pomstar Duplo 1 Set pro ha**					Ab Austrieb bis spätestens Ende Juli. Maximal 4 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Wartefrist: 3 Wochen. *Nur in Tankmischung mit Captan (80% WG), Konz. 0,1%. Behandlung gegen Monilia während der Blüte.
Blüten-u. Zweigdürre, Kelchfäule, Schorf		**Pyrus® 400 SC 0,8-1,2 l/ha oder 0,05-0,075%**					Antiresistenz-Strategie. Maximal 3 Behandlungen. Nur in Tankmischung mit Captan 80 % (0,1 %, 1,6 kg/ha) oder Dithianon 70 % (0,03 %, 480 g/ha). Auflagen beachten!
Schorf	**Curenox 50 WG 0,1 - 0,2%**						Vor der Blüte: 0,05-0,1%, Als Zusatz zu Netzschwefel. Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.
					Folpet 80 WDG 2 kg/ha oder 0,125%		Wartefrist: 3 Wochen. Auflagen beachten!
		Dithianon 70 WG 0,8 kg/ha oder 0,05%					Ab Austrieb bis Ende Juni. Behandlungen nach der Blüte: Pro Parzelle und Jahr insgesamt nicht mehr als 3400 g des Wirkstoffs Dithianon pro ha anwenden.
		Captan 80 WG 2,4 kg oder 0,15%					In Mischung 2 kg/ha. Sorteneinschränkung beachten. Wartefrist: 3 Wochen. Nicht mehr als 10 Anwendungen mit Captan-haltigen Produkten pro Parzelle und Jahr.
	Syllit (Dodine) 1,92 l/ha			**Syllit (Dodine) 1,92 l/ha**			Bis Mitte Juli. Wartefrist 60 Tage. Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Darf während der berostungskritischen Zeit nicht eingesetzt werden.
Echter Mehltau	**Schwefel 80 WG *Stulln* 0,5 - 0,75% vor der Blüte, 0,3 - 0,5% nach der Blüte**						In Mischung 0,1-0,2%. Wartefrist: 3 Wochen.
Blattläuse			**Bazooka 0,035%**				Spritzen. Max. 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr. Ab Nachblüte (BBCH69) bis spätestens Ende Mai. Nur in Obstanlagen gem. Art. 22 (SR 910.91, LBV).
Schildläuse, Birnenpockenmilben, Frostspanner, Spinnmilben	**Weissöl S 1 - 3,5%**						
Apfelblütenstecher	**Pyrinex®M22 3,2 l/ha oder 0,2%**						Anwendung: Beim Austrieb (BBCH 51-53). Wartefrist: 3 Wochen. Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Gewässerschutzauflagen beachten!
Apfelwickler, Austernschildläuse, Kleiner Fruchtwickler, Bodenseewickler, Sägewespen, Frostspanner, Gespinstmotten, Schalenwickler (Teilwirkung: Blattläuse, Gallmücken)			**Pyrinex® M22 3,2 l/ha oder 0,2%**		**Pyrinex® M22 3,2 l/ha oder 0,2%**		Im Sommer gegen Apfelwickler, Austernschildläuse, kleiner Fruchtwickler und Schalenwickler. Stadium 57-59 oder 69-71 gegen Frostspanner, Gespinstmotten und Schalenwickler. Stadium 69-72 gegen Bodenseewickler und Sägewespen. Wartefrist 3 Wochen. Max. 3 Behandlungen. Aktuelle Auflagen beachten!
Baumstreifen		**Glyphosat 360 TF 6 l/ha und/oder MCPP Combi 1 l/ha**					In 400 l Wasser. Von März bis Ende Juli. Ab 2. Standjahr.
Stippe		**Calciumchlorid 384 6 - 8 l/ha**					Mischbar mit Folpet oder Captan mit 2-4 l/ha.
Zur Düngung		**Flüssigdünger S 3 - 5 l/ha**					Nach der Blüte zu Fungiziden.
		Folio Micro 1 kg/ha					Diverse Spurenelemente.
Calcium-Blattdünger		**Folanx Ca29 2,5 kg/ha**					Gegen Stippe, Schalen- und Fleischbräune.

Schneiter GRO AG

Kirschen 2018



Spritzempfehlung
Anlagen ÖLN

1. Spritzung	*2. Spritzung*	*3. Spritzung*	*4. Spritzung*	*5. Spritzung*	*6. Spritzung*
Curenox 50 WG 4 kg/ha **Weissöl S** 1% 16 l/ha	**Pomstar Duplo** 0,25 l/ha + 1,6 kg/ha **Flüssigdünger S** 0,1-0,25% 2-5 l/ha	**Pomstar Duplo** 0,25 l/ha + 1,6 kg/ha **Flüssigdünger S** 0,1-0,25% 2-5 l/ha	**Dithianon 70 WG** 0,05-0,075% 0,8-1 kg/ha **Flüssigdünger S** 0,1-0,25% 2-5 l/ha	**Globaztar SC** 0,1% 1,6 l/ha **Flüssigdünger S** 0,1-0,25% 2-5 l/ha	**Dithianon 70 WG** 0,05% 0,8 kg/ha **Netzmittel S** 0,5 l/ha

Spritzempfehlung
Hochstamm + Anlagen mit Unternutzen

1. Spritzung	*2. Spritzung*	*3. Spritzung*	*4. Spritzung*	*5. Spritzung*
Curenox 50 WG 4 kg/ha **Weissöl S** 1% 16 l/ha	**Pomstar Duplo** 0,25 l/ha + 1,6 kg/ha **Flüssigdünger S** 0,1-0,25% 2-5 l/ha	**Pomstar Duplo** 0,25 l/ha + 1,6 kg/ha **Flüssigdünger S** 0,1-0,25% 2-5 l/ha	**Folpet 80 WDG** 0,1% 2 kg/ha **Flüssigdünger S** 0,1-0,25% 2-5 l/ha	**Dithianon 70 WG** 0,05% 0,8 kg/ha **Flüssigdünger S** 0,1-0,25% 2-5 l/ha

Erklärungen
Globaztar SC: Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Bis spätestens Stadium BBCH 70. Gewässerschutzauflagen beachten.
Faustregel: Im Streuobstbau entsprechen 2000 l Spritzbrühe einer Hektare.
Gegen Blattläuse: Pirimicarb 50 WG 0,02-0,04% + Netzmittel (Nützlingsschonend)
Nach Hagelschlag: Folpet 80 WDG 0,1%
Bakterienbrand: Im Herbst nach Blattfall: Bordeaubrühe WG 0,5-0,75%
Wartefristen: In der Regel 3 Wochen

Schneiter GRO AG

Erdbeeren 2018

	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Bemerkungen
Einjährige Unkräuter und Ungräser	**Rapsan 500 SC**	1,5-2 l/ha	Nach dem Pflanzen. Nicht in Vermehrungsanlagen. Grundwasserschutz: nicht mehr als 1 kg des Wirkstoffs Metazachlor pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von 3 Jahren anwenden. Abstandsauflagen beachten.
Einjährige Unkräuter	**Lenacil**	1,5-2 kg/ha	Splitbehandlung möglich. Ohne empfindliche Sorten. Abstandsauflagen beachten.
	Phenmedipham SE	2 x 3 l/ha	Vor der Blüte und nach der Ernte. Kein Zusatz von Öl. Sortenempfindlichkeit beachten.
Unkrautbekämpfung nach der Ernte oder nach einer Neupflanzung	**Napronol**	2,5 l/ha	Im Herbst. 5-8 Tage nach der Pflanzung. Empfindliche Sorten und Frigopflanzen nicht behandeln.
Gräserarten	**Select®**	0,5-1 l/ha +1- 2 l Rapsöl	Nachauflauf. Nicht mit anderen Herbiziden mischen. 0,5 l/ha gegen einjährige, 1 l/ha gegen mehrjährige Gräserarten. Anwendung vor der Blüte und nach der Ernte. Maximal 1 Behandlung pro Jahr.
Blattfleckenkrankheiten	**Bordeaubrühe WG**	2,5-7,5 kg/ha	Nur vor der Blüte und nach der Ernte. Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr. Diverse Auflagen beachten.
	Curenox 50 WG	0,1-0,3%	
	Cuprum flow	4,5-7,5 l/ha	
Rhizomfäule, rote Wurzelfäule	**Contender 80 WG**	0,5% (5 kg/ha)	2 x giessen, 1 x Anfang September, 1 x Anfang Oktober. Nur vor der Blüte und nach der Ernte. Max. 4 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Echter Mehltau	**Schwefel 80 WG** *Stulln*	2-4 kg/ha	Stadium Vollblüte bis Beginn Rotfärbung der Früchte. Keine Behandlung von der Blüte bis zum Ende der Ernte.
	Globaztar SC	0,1% (1 l/ha)	Wartefrist: 2 Wochen.Maximal 3 Behandlungen pro Kultur und Jahr.
	Difcor 250 EC	0,05% (0,5 l/ha)	Stadium Vollblüte bis Beginn Rotfärbung der Früchte. Wartefrist: 3 Wochen. Abstandsauflagen beachten. Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Graufäule (Botrytis cinerea)	**Pyrus® 400 SC**	0,25% (2,5 l/ha)	Stadium Vollblüte bis Beginn Rotfärbung der Früchte. Wartefrist: 2 Wochen. Max. 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.
Erdbeerblütenstecher	**Cypermethrin S**	0,25 l/ha	Wartefrist: 3 Wochen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Abstandsauflagen beachten.
	Ravane 50	0,04% (0,4 l/ha in 1000 l Wasser)	Stadium Vollblüte bis Beginn Rotfärbung der Früchte. Wartefrist: 3 Wochen. Abstandsauflagen beachten.
	Pyrinex (L+G)	0,3% (3 l/ha)	Stadium Vollblüte bis Beginn Rotfärbung der Früchte. Wartefrist: 3 Wochen. Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr. Abstandsauflagen beachten.
Schnecken	**Duroschneck Longlife**	7 kg/ha	Nicht auf essbare Pflanzenteile streuen.
Zur Pflanzenstärkung	**Impro-Set** (Crop-Set)	2 x 0,6 l/ha	1. Behandlung bei Wachstumsbeginn im Frühjahr, 2. Behandlung bei Beginn Blüte mit Fungizid übers Blatt. Ergibt Mehr-Ertrag und farbigere Früchte.
Eisenmangel	**Ferro Rapid**	300-400 g/a	Ausgangs Winter streuen und einarbeiten, oder auflösen und giessen.
Nährstoffmangel	**Folio Micro**	1 kg/ha	2 Behandlungen vor der Blüte. Nicht unter Tunnel.

Himbeeren 2018

	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Bemerkungen
Unkrautbekämpfung	**Diquat**	0,4% (4 l/ha)	In 300-1200 l Wasser/ha. Ab 1. Standjahr.
Gräserarten	**Propaq**	0,75-2,5 l/ha	Gegen gemeine Quecke. Splitbehandlung möglich.
Rutenkrankheiten	**Curenox 50 WG**	0,2-0,5%	Nur vor der Blüte und nach der Ernte. Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr. Diverse Auflagen beachten.
	Cuprum flow	7,5-12 l/ha	
	Bordeaubrühe WG	5-13 kg/ha	
Graufäule (Botrytis cinerea)	**Pyrus® 400 SC**	2,5 l/ha	Wartefrist: 2 Wochen. Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.
Rost	**Difcor 250 EC**	0,05% (0,5 l/ha)	Anwendung nur vor Blütenende und nach der Ernte. Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Himbeerkäfer	**Ravane 50**	0,02% (0,2 l/ha)	In 1000 l Wasser pro ha. Wartefrist: 3 Wochen. Diverse Schutz- und Abstandsauflagen beachten.
Blütenstecher		0,04% (0,4 l/ha)	
Eisenchlorose	**Ferro Rapid**	300-400 g/a	Streuen und einarbeiten oder auflösen und giessen.
Schutz vor Ernährungsstörungen	**Flüssigdünger XL**	0,2%	Den Fungizid-Spritzungen beifügen.

Wiesen und Weiden 2018

Wichtige Hinweise:

Keine Behandlung mit Wuchsstoff-Herbiziden im Hochsommer (ab + 25°C).
Keine Anwendung bei grosser Trockenheit, Hitze oder Nachtfrostgefahr.

Wartefristen: 3 Wochen, 2 Wochen für Rinder oder Galttiere.
Die Wartefristen gelten für alle Herbizide, ausser es ist im Spritzplan etwas anderes erwähnt.

Neusaaten	**Produkt**	**Dosierung / Aufwandmenge**	**Bemerkungen**
Im Frühling	**MCPB 400** **+ Asulam S** **+ Flüssigdünger S**	4 l/ha + 0,5 l/ha + 2 l/ha	Klee muss 3 echte Blätter haben. Nicht in Rotkleesamenkulturen sowie Alexandriner-, Tabor- oder Perserklee anwenden.
Luzerne	**Bentazon 480 S**	2 x 1-1,5 l/ha	Splitbehandlung. Nach 8-10 Tagen wiederholen.

Etablierte Bestände	**Produkt**	**Dosierung / Aufwandmenge**	**Bemerkungen**
Blacken	**Asulam S** **+ Flüssigdünger S**	4 l/ha + 5 l/ha	Anwendung vor Bildung der Blütenstände.
Blacken, ein- und mehrjährige Hahnenfuss-gewächse, diverse Unkräuter	**MCPB 400**	4-6 l/ha	Klee muss 3 echte Blätter haben. Behandlung bei wüchsigem Wetter vor Erscheinen der Blütenstiele durchführen. Nicht in Rotklee-Samenkulturen sowie Alexandriner-, Tabor- oder Perserklee anwenden.
Fadenehrenpreis	**Diquat**	4 l/ha	Anwendung: Spätherbst, kurz nach letzter Beweidung oder letztem Schnitt. Keine Behandlung mit Hand- oder Rückenspritze.
Alpenblacken, Farne	**Asulam S** **+ Flüssigdünger S**	7 l/ha + 5 lt/ha	
Grasnarbe-Erneuerung	**Glyphosat 360 TF** **+ Flüssigdünger S**	5 l/ha + 4 l/ha	Nach der Anwendung 1 Woche warten, danach mit Wiesenegge aufrauen und einsäen.

Einzelstock-behandlung	**Produkt**	**Dosierung / Aufwandmenge**	**Bemerkungen**
Blacken, Disteln, Brennesseln u.a. breitblättrige Unkräuter	**Blackomat**	bis 1:5 möglich	**Mischverhältnis Blackomat / Wasser:** Mit Blackomatgerät 2-3 dl auf 1 l Wasser. Mit Sobidoss / Rodoss 1-2 ml/Pflanze. Mit Rückenspritze: *Ideal:* 1 l auf 2 l Wasser. Bei warmen Wetter (18-25°C): Verdünnung bis 1 l auf 5 l Wasser (1:5) möglich (grossflächige Anwendung). Enthält roten Farbstoff zur Erkennung bereits behandelter Pflanzen. Schont Gräser.
Ambrosia (aufrechtes Traubenkraut)	**Globus**	3 ml in 10 l Wasser (0,03%)	Nur in Kombination mit Mulchen oder Schnitt einsetzen, am besten im 6-8 Blattstadium.
Winden, Germer	**Zwei-4D flüssig**	50 ml in 10 l Wasser	Gegen giftige Kreuzkräuter. Einzelstockbehandlung.
Alpenblacken, Farne, Blacken	**Asulam S**	2 dl in10 l Wasser	Schont Klee und Gräser. **Farn:** mit oberer Dosierung von 7-8 l/ha bekämpfen.
Blacken, Disteln, Brennesseln	**Tribel *plus***	0,125 l in 10l Wasser	Schont Gräser. Wartefrist bis zum nächsten Weidegang: 3 Wochen für alle Tiere. Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr. Einzelpflanzenbehandlung.

Garten / Hof 2018

Zierpflanzen	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Bemerkungen
Gräserarten	**Propaq**	0,75-2,5 l/ha	
Rostpilze, Blattfleckenkrankheiten, Krankheiten durch pathogene Bodenpilze	**Chlorotal 500**	0,2-0,3%	= 20-30 ml in 10 l Wasser
Falscher Mehltau, Rostpilze	**Dithianon 70 WG**	0,05%	5 g in 10 l Wasser. Sicherheits- und Gewässerschutzauflagen beachten.
Krankheiten durch pathogene Bodenpilze, Falsche Mehltaupilze	**Contender 80 WG**	Spritzen: 0,25% Giessen: 10 g/m^2	Giessen: Nur für Topf- und Containerpflanzen.
Echter Mehltau	**Schwefel 80 WG** *Stulln*	0,1-0,2%	= 10-20 g in 10 l Wasser
Graufäule	**Ibiza SC**	0,04%	= 4 ml in 10 l Wasser. Maximal 3 Behandlungen pro Kultur. Nicht mit anderen Produkten mischen Nur für Topf- und Containerpflanzen.
Napfschildläuse, Thujaminiermotten	**Hagar WG**	0,025-0,05%	= 2,5 - 5 g
Thripse	**Deltaphar® 25 EC**	0,05%	= 5 ml in 10 l Wasser
Blattfressende Raupen, Erdraupen, Blattkäfer, Blattläuse, Thripse, Blindwanzen, weisse Fliegen, Trauer- und Gallmücken	**Ravane 50**	0,02%	= 2 ml in 10 l Wasser. Bei Anwendung im Gewächshaus ist dieses vor dem Wiederbetreten gründlich zu lüften. Nur gegen nichtresistente Stämme geeignet.
Blattläuse	**Pirmicarb 50 WG**	0,05%	Spritzen = 5 g in 10 l Wasser. Maximal 3 Behandlungen pro Kultur und Jahr.
Hemmung des Längenwachstums (Stauchen)	**CCC**	Spritzen: 0,15-0,2% Giessen: 0,1-0,5%	Bei Anwendung im Gewächshaus ist dieses vor dem Wiederbetreten gründlich zu lüften. Giessen: Nur für Topf- und Containerpflanzen.
	Dazide Enhance	0,06-0,6%	6-60 g in 10 l Wasser mit Rückenspritze.
Förderung des Längenwachstums	**Gibberellin A3**	1-2 Tabletten	auf 1-10 l Wasser
Zur Düngung	**Flüssigdünger XL**	50 ml pro 5 l Wasser	Für Blumen und andere Zierpflanzen. 3 x pro Monat dem Giesswasser beifügen.
Grün-Effekt und gegen Eisenmangel	**Ferro Rapid**	0,2%	= 20 g in 10 l Wasser Beim Giessen die Blätter nicht treffen.

Nützliches	Produkt	Dosierung / Aufwandmenge	Bemerkungen
Gegen Schnecken	**Duroschneck Longlife**	70 g/a	Gleichmässig ausstreuen. Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen. Ungefährlich für Igel und Regenwürmer.
Gegen Mäuse und Ratten im Haus	**Mausköder S Körner**		An den von Mäusen begangenen Orten Köder möglichst geschützt (Köderstation) auslegen.
	Mausköder S Flocken	so lange Vorrat	
Sichere Ratten-und Mäusebekämpfung	**Bonirat® Pasta**		**Gebrauchsfertiger Pastaköder zu Köderstation. Auch als Set erhältlich.**
	Bonirat® Block		**Gebrauchsfertiger Block-Köder zu Köderstation. Auch als Set erhältlich.**
Dosierung	**Messbecher 1 l + 5 l**		Aus Polypropylen, mit ml-Skala
Reinigungsmittel	**Netzmittel S**	10 ml	Für Maschinen und Spritzgeräte.
	Agro-Quick	2 dl	Der Spritzgerätereiniger.
Allzweckstreuer	**Speedy**		Für müheloses Streuen von Granulaten, Schneckenkörnern, Dünger, Streusalzen, Grassamen etc. Streubreite bis 7 m.
Sprühgerät	**Blackomatgerät**		Solides Druckpumpgerät mit Verlängerung für mühelose Einzelstockbehandlung mit Blackomat oder anderen Produkten. Ideal auch für alle Sprüharbeiten im Haus, Feld und Stall.

TRIBEL PLUS

Selektives, Blattaktives Herbizid mit schneller und nachhaltiger Wirkung gegen Problemunkräuter wie Brennesseln, Distel-Arten und Blacken auf Wiesen, Weiden und Brachland.

Auch für Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen (gem. ChemRRV) bewilligt.

Wirkungsweise:

Tribel Plus enthält 2,4-D (Gruppe der Aryloxysäuren) und Triclopyr (Gruppe der Picolinsäuren). Beide Wirkstoffe werden über das Blatt aufgenommen und durch ihre systemische Wirkung bis in die Wurzeln der Schadpflanzen verteilt. **Schont Gräserarten!**

Aufwandmenge:

0,125 l in 10 l Wasser *(Auflagen und Gebrauchanweisung beachten!)*

Wirkstoff / Gehalt: 103,6 g/l Triclopyr + 93 g/l 2,4-D
Formulierung: Emulsionskonzentrat (EC)
Verpackungen: 1 l , 12 x 1 l

Auf Ökoflächen im ÖLN nicht bewilligt.

Schneiter AGRO AG

Produkte & Beratung für die Landwirtschaft

Neu im Sortiment

GLOBAZTAR SC

Fungizid gegen Krankheiten im Beeren-, Obst-, Gemüse- und Feldbau sowie in Zierpflanzen

- **Teilsystemisch**
- **Regenfest**
- **Gute und lang anhaltende Wirkung**

Wirkt u.a. gegen folgende Pilzkrankheiten:
Blattfleckenpilze, Echten und Falschen Mehltau, Ringflecken, Rutenkrankheit, Rostpilze, Brenn- und Netzfleckenkrankheit, Schrotschuss, Alternaria, Kraut- und Knollenfäule, Blüten- und Zweigdürre u.v.m.

Wirkstoff / Gehalt:	22,9% Azoxystrobin (250 g/l)
Formulierung:	Suspensionskonzentrat (SC)
Verpackungen:	5 l (4 x 5 l)

Auflagen und Gebrauchanweisung beachten!

Schneiter AGRO AG
Produkte & Beratung für die Landwirtschaft

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Schneiter AGRO AG

Preise / MWSt / VOC

Diese Preisliste ersetzt alle vorhergehenden. Gewisse Produkte unterstehen der Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV) und werden mit einem Abgabesatz von Sfr. 3.-/kg belastet.

Die MWSt sowie die VOC Abgabe wird in der Preisliste wie folgt angewendet:

Ankaufspreise: Die MWSt und die VOC Abgabe ist *nicht* eingeschlossen und wird auf der Faktura separat ausgewiesen.

Richtpreise/Verkauf: Die MWSt von 2,5% bei Pflanzenschutz- und Düngemitteln resp. 7,7% auf den übrigen Produkten und die LSV-Abgabe sowie die VOC-Abgabe ist im Preis eingeschlossen.

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Franco-Lieferung ab Fakturabetrag Fr. 2000.-- pro Lieferung, unter Fr. 2000.-- werden die effektiven Transportkosten belastet.

Qualitätsgarantie

Produkte- und Preisänderungen vorbehalten. Unsere Pflanzenschutzmittel sind vom Bundesamt für Landwirtschaft geprüft und bewilligt. Eine Garantie für Qualität kann nur übernommen werden, wenn die Produkte in unseren Originalpackungen verkauft werden. Es sind nur deren Anwendungs- und Konzentrationsvorschriften als Gebrauchsanweisung massgebend. Für Schäden, die aus unsachgemässer Lagerung, vorschriftswidriger Anwendung oder durch von uns nicht beeinflussbare Begleitumstände entstehen, lehnen wir jede Haftung ab.

Lagerung

Sämtliche Pflanzenschutzmittel sind trocken, frostfrei und unter Verschluss zu lagern.

Transportschäden / Transportverluste

Transportschäden und Transportverluste sind bei der Übernahme der Ware sofort dem Transporteur zu melden, damit eine Tatbestandsaufnahme erstellt werden kann. Unterbleibt die rechtzeitige Meldung, kann der Schadenersatz verweigert werden.

Mängelrügen

Reklamationen betreffend unvollständiger Lieferung oder mangelhafter Ware müssen uns sofort nach Wareneingang, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen unterbreitet werden. Verspätete Reklamationen können abgelehnt werden.

Retoursendungen

Als oberstes Prinzip gilt, dass Retouren an den direkten Lieferanten, d.h. vom Wiederverkäufer an den Grossisten zu richten sind. Von uns werden Waren nur zurückgenommen, wenn diese mit unserem Einverständnis und franko an unsere Adresse geschickt werden.

Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)

In unseren Verbraucherpreisen ist die Lenkungsabgabe inbegriffen.

Giftverkehrsbestimmungen

Mit der Übernahme der Ware verpflichtet sich der Empfänger, diese entsprechend den kantonalen und eidgenössischen Verordnungen betreffend dem Verkauf von Pflanzenschutzmitteln zu handhaben.

Vergiftungsfälle

Bei Vergiftungsfällen mit Pflanzenschutzmitteln ist sofort ein Arzt zu konsultieren. In Notfällen gibt die nachstehende Beratungsstelle zu jeder Tages- und Nachtzeit Auskunft über die zu treffenden Massnahmen:

Toxikologisches Informationszentrum in Zürich: Tel. 145

GHS-Kennzeichnung

GHS 03 GHS 05 GHS 06

GHS 07 GHS 08 GHS 09

Was ist GHS?

GHS = Globally Harmonised System. Das ist ein Kennzeichnungssystem, welches gefährliche Chemikalien weltweit vergleichbar kennzeichnet.
In Europa wird das GHS gemäss der CLP-Verordnung (EG) 1272/2008 umgesetzt. Auch in der Schweiz sind Produkte nach dem neuen System gekennzeichnet.

GHS 03 Brandfördernd
GHS 05 Ätzend
GHS 06 Hochgiftig
GHS 07 Vorsicht gefährlich
GHS 08 Gesundheitsschädlich
GHS 09 Gewässergefährdend

Integrierte Produktion

Die Vorschriften für ÖLN und Labelproduktion sind zum Teil je nach Region verschieden. Beachten Sie deshalb auch die Richtlinien Ihres Kantons oder Vertragspartners.

Neu
im Sortiment

NACETO

Kombiniertes Herbizid zur Bekämpfung von einjährigen Gräsern und Unkräutern im Wintergetreide

- **Sehr breites Wirkungsspektrum**
- **Ideal für ein sinnvolles Resistenzmanagement**
- **zur frühzeitigen Bekämpfung einsetzbar**

Wirkstoffe/ Gehalt:	32,5% Flufenacet (400 g/l); 16,3% Diflufenican (200 g/l)
Formulierung:	Suspensionskonzentrat (SC)
Verpackungen:	1 l (10 x 1 l) und 3 l (4 x 3 l)

Schneider AGRO AG

Produkte & Beratung für die Landwirtschaft